


便秘・便秘に伴う諸症状の緩和

植物性便秘薬

ロンターゼ スリムファイバー

植物せんい・生薬配合



第②類医薬品

36包
顆粒剤

ロンターゼスリムファイバー

第②類医薬品

〔効能・効果〕

・便秘
・便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常發酵、痔

〔用法・用量〕

次の用法・用量を守り、服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1~2包	1日2回朝夕の空腹時(又は食前あるいは食間)。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。
7歳以上15歳未満	1/2~1包	
7歳未満		服用しないこと

〔用法・用量に関連する注意〕

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- コップ一杯(約180mL)の水又はぬるま湯で、かまずに服用してください。

使用期限

製造番号



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

第②類
医薬品

販売名：ロンターゼスリムファイバー
ロンターゼスリムファイバーは、植物せんいのプランタゴ・オバタ種皮と、生薬成分のトウキ末、ケツメイシ乾燥エキス、センシド・カルシウム、さらにビタミンB₁・B₆を配合した便秘薬です。おだやかな作用で、自然に近いお通じを促し、さらに便秘に伴う肌あれ、吹出物を改善します。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬(下剤)
- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- 大量に服用しないでください。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。 (げせい)腹痛、吐き気、嘔吐
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	げせい)腹痛、吐き気、嘔吐

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢
- 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕 4包(6g)中

プランタゴ・オバタ種皮	4,800mg
トウキ末	450mg
ケツメイシ乾燥エキス	400mg
(ケツメイシとして4,000mg)	
センシド・カルシウム	91mg
(センシドA・Bとして32.56mg)	
チアミン硝酸化物(ビタミンB ₁ 硝酸塩)	24mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	48mg
添加物として、カラメル、白糖、スクラロース、香料を含有します。	

〔成分・分量に関連する注意〕

本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤色になることがあります。これは本剤に含まれるセンシドによるものです。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

製造販売元

日本製薬工業株式会社

愛知県小牧市小木東一丁目18-6

お問い合わせ先

日本製薬工業株式会社 お客様相談室

電話 (0568) 42-1234

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

http://www.sg-nsk.co.jp/

副作用被害救済制度

電話 0120-149-931

紙箱、仕切り