

この添付文書は、使用前によくお読みください。  
また、使用が終わるまで大切に保管してください。



第2類医薬品

## 和漢薬配合便秘薬

# ダイオー 和漢便秘薬

## 〔ダイオー和漢便秘薬の特長〕

1. ダイオー和漢便秘薬は大腸に作用して、大腸の蠕動運動を促進させ、ゆるやかな下剤効果を示す5つの和漢薬を配合した便秘薬です。
2. ダイオー和漢便秘薬の服用量と効果の程度は比較的個人差がありますが、ダイオー和漢便秘薬の緩下作用はおだやかですから、水様便になることはまれです。したがって高齢者や病床者のみならず若い女性の方にも服用していただけます。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
  - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4)次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚（ふ）	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常酵素、痔

## 【用法・用量】

	2～3日便通がないとき	4日以上便通がないとき
成人（15歳以上）	1～3錠	2～4錠
7歳以上15歳未満	0.5～1.5錠	1～2錠
7歳未満	服用しないでください	

上記の量を1日1回就寝前に服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しづつ增量又は減量してください。

### ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【成分・分量と作用】

1日量（4錠）中

成 分	分 量	作 用
アロエ末	300mg	大腸を刺激して蠕動運動を促進し、排便を促します。
センナ末	500mg	
ダイオウ末	400mg	
ケイヒ末	100mg	胃腸機能を亢進し、食欲不振などを改善します。
ガジュツ末	100mg	

添加物として、セルロース、ケイ酸Al、タルク、ステアリン酸Mg、CMC-Caを含有します。

### ＜成分・分量に関連する注意＞

- (1)本剤の服用により、尿が黄褐色から赤色を帯びることがあります。これは本剤中のダイオウ末などによるもので心配ありません。
- (2)本剤は生薬（薬として用いられている草根木皮）から出来ている製品ですので、製品によって錠剤の色が多少異なることがあります。また、錠剤の表面に斑点等が見られる場合がありますが、異物や変色ではなく生薬成分ですので効果には変わりはありません。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)ビンのフタが不完全な場合、湿気などの影響を受けて、薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

T E L : 0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元



ダイオー株式会社  
東京都文京区本郷2-27-17

製造販売元

福地製薬株式会社  
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824