

サララ便秘薬

第②類医薬品

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

❶ 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の瀉下薬(下剤)

❷ 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

❸ 大量に服用しないこと

必ずお守り下さい



相談すること

❶ 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- ①医師の治療を受けている人。
- ②妊婦又は妊娠していると思われる人。
- ③薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ④次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

❷ 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

❸ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

❹ 1週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の量を就寝前(又は空腹時)に服用する。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量する。

年 齢	1 回 量	服用回数
成人(15歳以上)	1～2錠	1日1回
15歳未満	服用しない	

(錠剤の取り出し方)

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



(裏面も読むこと。)

効能・効果

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔



成分・分量（2錠中）

成 分	分 量
センノシド	60mg(センノシドA・Bとして24mg)
カンゾウエキス末	50mg(カンゾウとして350mg)
有孢子性乳酸菌	50mg

添加物としてセルロース、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mgを含有。

保管及び取扱い上の注意

- 1 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 2 小児の手の届かない所に保管すること。
- 3 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- 4 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
明治薬品株式会社 お客様相談室
電 話：☎0120-53-3451
受 付 時 間：9:00～17:00（土、日、祝日、特定休日を除く）

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

製造販売元
 **明治薬品株式会社**
富 山 県 富 山 市 三 郷 6 番 地