

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

第②類医薬品

日本薬局方
センナ末

⚠ 使用上の注意

❌ 【してはいけないこと】

(守らないと、現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと。
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。
3. 大量に服用しないこと。



【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

下痢

4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和: 頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、
食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法・用量

次の量をなるべく就寝前に服用して下さい。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ
増量又は減量して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	0.375~0.75g	1回
15才未満	服用しないで下さい	

※添付さじ すりきり 約0.5g

〈用法・用量に関する注意〉

用法・用量を厳守して下さい

成分・分量

1日量(0.75g)中 日本薬局方 センナ末 0.75g

保管および取扱上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変わる為)

その他の注意

1. 本品は生薬の粉末ですので、製品により粉末の色調が多少異なること
がありますが、効果には変わりありません。

お客様相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

製造販売元: 株式会社 延寿堂(えんじゅどう)

〒930-0813 富山県富山市下赤江町1-13-3

電話: 076-431-7017 FAX: 076-431-7013

受付時間: 午前9:00から午後4:30まで(土、日、祝日を除く)