

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

第2類医薬品

A:COOP クミアイ
ピサコレット
便秘薬

特徴

- ピサコジルとアロエエキスを配合した腸溶性のフィルムコーティング錠です。2つの成分が大腸粘膜に直接作用し、大腸の正常なぜん動運動を促して自然に近い排便を起こします。
- ビタミンB₆が便秘に伴う肌あれや吹出物を緩和します。
- 便秘の程度に応じて、服用する量を調節できます。
- 就寝前の服用により、翌朝におだやかなお通じが得られます。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
2. 大量に服用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 次の症状のある人：はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1週間間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法・用量

次の量を、就寝前（又は空腹時）に服用してください。なお、便秘の程度や状態には個人差があるので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年齢	1回量	服用回数
15歳以上	1～3錠  ～  	1日1回
11歳～14歳	1～2錠  ～  	
11歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 本剤は腸溶性ですので、かんだり、つぶしたりせずにそのまま服用してください。また、制酸剤又は牛乳と同時に服用しないでください。

成分・分量 1日量(3錠)中

成分	含量	はたらき
ビスコジル	15mg	大腸刺激性の下剤です。大腸粘膜に作用して排便反射を刺激します。
アロエエキス (日局アロエ210mgに相当)	105mg	大腸内の水分量を高めて便を柔らかくすると共に、腸のぜん動運動を高めて排便を促します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	30mg	便秘に伴う肌あれや吹出物に効果をあらわし、改善します。

添加物として、セルロース、部分アルファー化デンプン、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース酢酸エステルコハク酸エステル、クエン酸トリエチル、タルク、ラウリル硫酸Na、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、赤色3号を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気のない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 服用のつどキャップをよくしめてください。
- (5) ビンの中の詰め物は、キャップをあけた後は捨ててください。(詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものです。)
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

お客様相談窓口 ☎ 0238(46)2013
月～金曜日 9:00～17:00 (祝日を除く)

製造販売者 協同薬品工業株式会社
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930