

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

ティファSプラス錠

特徴

酸化マグネシウムが腸内に水分を集め、便を柔らかくすることにより、腸の動きを促進させ、自然な排便を促します。

肌トラブルを改善する効果のあるヨクイニン配合し、便秘による肌あれや吹出物を解消します。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
(5) 次の診断を受けた人。
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
精神神経系	強い眠気、意識がうすれる
循環器	立ちくらみ、脈が遅くなる
呼吸器	息苦しい
その他	筋力の低下、口のかわき

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

● 効能・効果

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：
頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

● 用法・用量

次の1回量を1日1回就寝前にコップ1杯の水で服用してください。
ただし、便秘の程度、状態には個人差があるので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

成人(15歳以上) ……………	1回3～6錠	11歳以上15歳未満 ……………	1回2～4錠
7歳以上11歳未満 ……………	1回2～3錠	5歳以上7歳未満 ……………	1回1～2錠
5歳未満 ……………	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

● 成分・分量 6錠(成人1日服用量)中に、次の成分を含有します。

酸化マグネシウム ……………	2000mg
ヨクイニンエキス(ヨクイニンとして2015mgに相当) ……	155mg*
※生薬の為、錠剤表面に茶点が見られる場合がありますが、品質には問題ありません。	
ピリドキシン塩酸塩 ……………	5mg
添加物として、セルロース、クロスカルメロースナトリウム、マクロゴール6000、エリスリトール、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、1-メントール、ステアリン酸カルシウムを含有します。	

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)容器の中の詰め物は錠剤の破損防止の為です。服用時に捨ててください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 058-246-8771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

協和薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号