

この説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。  
なお、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります】

1. 次の人は服用しないでください。  
(1) はげしい腹痛又は吐き気・嘔吐のある人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 3歳未満の乳幼児  
(4) 防虫剤（ナフタリン等）、殺虫剤（猫イラズ等）等の薬剤を誤って服用した人  
(このような場合は、直ちに医師の治療を受けてください。)
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。  
駆虫薬、他の瀉下薬（下剤）
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
4. 連用しないでください。

#### 🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状           |
|------|---------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 消化器  | はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢

日本薬局方 第2類医薬品

# 加香ヒマシ油

Aromatic Castor Oil

加香ヒマシ油「コザカイ・P」

20mL

瀉 下 剤（下剤）



製造販売元 小堀製薬株式会社

東京都墨田区両国4-36-9

### 効能・効果

腸内容物の急速な排除（食あたり等）

### 用法・用量

大人（15歳以上）…… 1回20mL  
11歳以上～15歳未満…… 1回13mL  
7歳以上～11歳未満…… 1回10mL  
3歳以上～7歳未満…… 1回 6mL  
いずれも1日1回を限度として、そのまま又は水、牛乳などに浮かべて必要時服用する。

（用法・用量に関連する注意）

1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
2. 就寝前の服用をさけてください。

### 成分及び分量

本品20mL中にヒマシ油19.8mL、ハッカ油0.1mL、オレンジ油0.1mLを含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
（独）医薬品医療機器総合機構

[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

☎ 0120-149-931（フリーダイヤル）

＜小堀製薬お客様相談窓口＞

電話：03-3631-1495（代表）

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

開封口

日本薬局方 第2類医薬品

# 加香ヒマシ油

Aromatic Castor Oil

加香ヒマシ油「コザカイ・P」

20mL

瀉 下 剤（下剤）



製造販売元 小堀製薬株式会社

東京都墨田区両国4-36-9