

【瀉下薬(便秘薬)】

爽快泉

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
- 大量に服用しないこと



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

○便秘

○便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法・用量

次の量を就寝前に服用して下さい。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しづつ增量又は減量して下さい。

年 齢	1 回量		1 日服用回数
15歳以上	2～3日便通がないとき	2～4錠	1回
	4日以上便通がないとき	4～6錠	
15歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

本剤 6錠(1.8g)中

コウボクエキス	25mg	トウキエキス	120mg
ジオウエキス	250mg	ダイオウ末	800mg
シャクヤクエキス	120mg	ジオクチルソジウム	
センキュウエキス	100mg	スルホサクシネート	120mg

添加物としてステアリン酸マグネシウム、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

・本剤は黄褐色で、特異なにおいを有し、味は苦い素錠です。

・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調が異なることや、また天然生薬色素により容器・包装等が黄味を帯びることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号