# 和漢通じく汁り

# 和漢 通じくすり 招ふく



## (用法・用量)

15才以上……1回1包~2包 11才~14才

…1回%包(20丸)~%包(40丸) 7才~10才 …1回%包(15丸)~1包(30丸)

3才~6才

…1回1/3包(10丸)~2/3包(20丸)

いずれも1日1回就寝時(又は空腹時)に服用すること。 但し初回は最少量を用い便通 の具合や状態をみながら少し ずつ増量又は減量すること。

製造販売元

太陽堂製薬株式会社 お客様相談室 0744-52-2174

丸薬

# 和漢・通じくナケ 招ふん

## 効能・効果

第2類医薬品

- ●便秘
- ●便秘に伴う次の症状の緩和 頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、

丸薬

188 0120-149-931 副师甬裰害救済制度

い場所に保管すること。

いし 京いな 少の 浸 盛 > かる な 、 れ ち 多 光 日 根 直 . & 。とこるも習界コ雨いな休ととの手の肌心、「

#### 〔成分・分量〕

2包(60丸)中

ダイオウ末……650mg センナ末……600mg アロエ末…… 75mg ケンゴシ末……… 55mg オウゴン末……200mg センキュウ末……250mg

なお、添加物として以下のものを含む。 コメデンプン、ショ糖脂肪酸エステル、 パラベン、バレイショデンプン、ポリビ ニールアセタールジエチルアミノアセ テート、赤色2号、黄色4号、青色2号

配置期限

22包入 ¥1.500+(税)

2009年6月改定( )

服用に際して、この説明文書を必ず読むこと。 また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

## 第②類医薬品()

## 招ふく

#### 規則正しいお通じを得るために

便秘薬に頼る前に、普段の生活から便秘の改善に努めましょう。

- 1.朝起きたら、コップ1杯の冷たい水や牛乳を飲みましょう。(腸の働きを良くします。)
- 2.朝食を摂りましょう。(腸の働きを良くします。)
- 3.朝食の後はトイレに行く習慣をつけましょう。(排便タイムを作りましょう。)
- 4.食事は朝・昼・夜、規則的に摂りましょう。(食事が少ないと便のカサが減ってしまいます。)
- 5.野菜や海草で食物繊維を摂りましょう。(便のカサを増やします。)
- 6.便意を感じたらガマンしないでトイレに行きましょう。
- (ガマンをすると腸の蠕動運動が悪くなり、腸の中の便が水分を失って硬くなってしまいます。) 7.適度な運動をしましょう。

## ⚠ 使用上の注意 -

## ◯ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。
- 他の瀉下薬(下剤)
- 2.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。 3.大量に服用しないこと。

## 🖺 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)次の症状のある人。:はげしい腹痛、悪心・嘔吐
- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。
- (1)服用後、次の症状があらわれた場合。

_			
	関係	部 位	症状
Γ	皮	١Š١	発疹・発赤、かゆみ
	消化	′ 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2)1週間位服用しても症状がよくならない場合。
- 3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた 場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
  - ・・・・下痢

#### ●[田法・田量]

年令	1 回服用量			
1 5 才以上	1 回 1包~2包			
11才~14才	1回2/3包(20丸)~4/3包(40丸)			
7 オ ~ 10オ	1回1/2包(15丸)~1包(30丸)			
3オ~6オ	1回1/3包(10丸)~2/3包(20丸)			
o-t				

3才未満は服用しないで下さい。

いずれも1日1回就寝前(又は空腹時)に服用して下さい。 ただし初回は最少量を用い便通の具合や状態を見ながら少しずつ増量又は減量すること。

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、 よく注意すること。

#### ● [成分·分量] 2包(60丸)中

成 分	含量
ダイオウ末	650mg
センナ末	600mg
アロエ末	75 mg


成 分	含量
ケンゴシ末	55mg
オウゴン末	200mg
センキュウ末	250mg

なお、添加物として下記のものを含みます。

コメデンプン、バレイショデンプン、パラベン、黄色4号(タートラジン)アマランス、インジゴカル ミン、ショ糖脂肪酸エステル、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に 保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
  - (誤用の原因になったり品質が変わる。)



| 副作用被害救済制度: 0 1 2 0 − 1 4 9 − 9 3 1 | ( )

本製品のお問い合せは、配置員又は下記までお願いします。

## 【製造販売元・お問い合わせ先】

## 太陽堂製薬株式会社 お客様相談室()

〒635-0153 奈良県高市郡高取町下土佐578 電話 0744-52-2174(受付時間8:30~17:00 土・日祝を除く)