



日本薬局方 センナ
販売名：センナ ダイコー
内容量：200g

袋表ラベル


 袋：PE, PP


第②類医薬品 日本薬局方

センナ

【用法及び用量】
 大人（15歳以上）は1日量1.5～3gに熱湯約150mLを加え、15分間煮た後にかすをかして取り去り、なるべく就寝前1回に服用する。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量、又は減量する。

【効能又は効果】
 便秘
 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔
 （裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）


内容量 200g
Lot.



 4 987716 137427

製造販売元
 名古屋市千種区松軒一丁目5番12号
大晃生薬株式会社

袋裏ラベル


4

 使用上の注意

してはいけないこと 

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。…他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- 大量に服用しないでください。

相談すること 

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人…はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。…下痢
- 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。