

日本薬局方 ジュウヤク

販売名：ジュウヤク ダイコー

内容量：500g

袋表ラベル



日本産

第3類医薬品日本薬局方刻

# ジュウヤク

**【用法及び用量】**  
大人（15歳以上）は1日量15gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、かすをこして取り去り、食前または食間3回に分服する。  
（食間とは…食後2～3時間を指します。）

**【効能又は効果】**  
便秘、尿量減少、便秘に伴う吹出物

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

**内容量 500g**

Lot.



4 987716 133658


製造販売元  
名古屋市千種区松軒一丁目5番12号  
**大晃生薬有限公司**

袋裏ラベル

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）  
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。…他の瀉下薬（下剤）

相談すること 

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 次の症状のある人  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。…下痢
- 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- 1ヵ月位（便秘、便秘に伴う吹出物に服用する場合は5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

— 保管及び取扱い上の注意 —

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になり品質が変わります。）
- 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。