



大晃生薬印



大晃生薬

大晃生薬有限会社

名古屋市千種区松軒一丁目5番12号

【用法及び用量】

大人（15歳以上）は1日1回0.75～1.5gをなるべく就寝前に服用する。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量、又は減量する。

【効能又は効果】

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔



紙箱



内袋：PE/PET

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

第2類医薬品

日本薬局方

ダイオウ末

内容量 500g

Lot.



4 987716 141158

保管及び取扱い上の注意

- (1)本品は吸湿してカビが生じたり虫がつく事がありますので、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

大晃生薬有限会社 試験室

電話:フリーダイヤル 0120-335064

受付時間:9時~12時,13時~17時

(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話:フリーダイヤル 0120-149-931

⚠ 使用上の注意

4

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. **本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。**…他の瀉下薬(下剤)
2. **授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。**
3. **大量に服用しないでください。**

相談すること

1. **次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。**
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人…はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. **服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。**…下痢
4. **1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。**

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり品質が変わります。)
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。