

ウチダのセンナTU 100g

第②類医薬品

ウチダのセンナTU 100g

日本薬局方センナ 中国産

用法・用量 大人(15歳以上)は1日量1.5~3gを熱湯150mLを加え、15分間煮た後に滓をこして取り去り、なるべく就寝前1回に服用する。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

用法・用量に関連する注意 定められた用法・用量を厳守すること。

効能・効果 便秘 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

※本品には、品質保持(カビ・虫害等防止)のために脱酸素剤が入っています。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

ロット：0002976

使用期限：0000.00



4 987359 617027

NMK

発売元

株式会社ウチダ和漢薬

新潟県上越市大潟区蜘蛛池1755-3

<お問合せ先> お客様相談センター

電話番号 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元

鶴居薬品工業株式会社

富山県南砺市野尻457-1

脱酸素剤封入

センナ



製品情報はこちら

第②類医薬品

ウチダのセンナTU

MTG

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 大量に服用しないこと

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)

第②類医薬品

ウチダのセンナTU 500g

日本薬局方センナ 中国産

用法・用量 大人(15歳以上)は1日量1.5~3gを熱湯150mLを加え、15分間煮た後に滓をこして取り去り、なるべく就寝前1回に服用する。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

用法・用量に関連する注意 定められた用法・用量を厳守すること

効能・効果 便秘
便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

※本品には、品質保持(カビ・虫害等防止)のために脱酸素剤が入っています。

ロット：???2975

使用期限：???????

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931



発売元
株式会社ウチダ和漢薬
新潟県上越市大潟区蜘蛛ヶ池1755-3
〈お問合せ先〉お客様相談センター
電話番号 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30
(土、日、祝日を除く)

製造販売元
鶴居薬品工業株式会社
富山県南砺市野尻457-1

脱酸素剤封入



製品情報はこちら

NMK

センナ

第②類医薬品

ウチダのセンナTU

MTG

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 大量に服用しないこと

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)