

ウチダのどくだみTU 200g

第3類医薬品 ウチダの **どくだみTU** 200g
日本薬局方ジュウヤク


用法・用量 大人(15歳以上)は1日量15gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。


用法・用量に関連する注意 定められた用法・用量を厳守すること。

効能・効果 便秘、尿量減少、便秘に伴う吹出物

ロット : 0002970 **使用期限** : 0000.00

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

 **使用上の注意**

 **相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 保管及び取扱い上の注意**

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

※本品には、品質保持(カビ・虫害等防止)のために脱酸素剤が入っています。

発売元
株式会社ウチダ和漢薬
新潟県上越市大潟区蜘蛛池1755-3

製造販売元
鶴居薬品工業株式会社
富山県南砺市野尻457-1

<お問合せ先>お客様相談センター
電話番号 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

NMK

ジュウヤク



脱酸素剤封入



製品情報はこちら

ウチダのどくだみTU 500g

第3類医薬品

NMK

ウチダのどくだみTU 500g

日本薬局方ジュウヤク 日本産 寸

用法・用量 大人(15歳以上)は1日量15gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

用法・用量に関連する注意 定められた用法・用量を厳守すること。

効能・効果 便秘, 尿量減少, 便秘に伴う吹出物



製品情報はこちら

脱酸素剤封入

ロット : 0002957
使用期限 : 0000.00

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931



4 987359 650055

発売元

株式会社ウチダ和漢薬
新潟県上越市大潟区蠅ヶ池1755-3

<お問合せ先>お客様相談センター
電話番号 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

鶴居薬品工業株式会社
富山県南砺市野尻457-1

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

※本品には、品質保持(カビ・虫害などの防止)のために脱酸素剤が入っております。