



**第②類医薬品**

**使用上の注意**

してはいけないこと

- 本剤を服用中は他の下剤を服用しないこと。
- 授乳中の人は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳をさけること。
- 大量に服用しないこと。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 激しい腹痛、悪心、嘔吐の症状がある人。
  - 体力の衰えている人。
  - 胃腸が弱くて下痢しやすい人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 

関係部位	症 状
皮膚	発疹、発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心、嘔吐

  - 一週間位服用しても症状がよくなる場合。
  - まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
- 下痢の症状が続いたりひどくなった場合は、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

服用の際は用法、用量を守ってください。

**効能、又は効果**

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：  
頭重、のぼせ、肌あれ、吹き出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔。

**用法及び用量**

大人(15歳以上)は、1日3～6gに熱湯約150mlを加えて15分間煮てかすを取り去り、なるべく寝る前1回服用する。

**保管及び取扱い上の注意**

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- 本品には防虫、防カビのために脱酸素剤を封入していますので、これを一緒に服用しないようにご注意ください。
- ご購入の際、万一異常がありましたら、お手数ですがお知らせください。

**副作用被害救済制度**  
電話：0120-149-931

製造元  
京都市中京区二条通東洞院西入る仁王門町29-2  
中嶋生薬株式会社  
TEL075-231-2633

使用期限

日本薬局方 センナ  
第②類医薬品  
ナカジマ センナ

4 936246 110790

使用期限 Lot.

副作用救済制度 TEL0120-149-931

**【御注意】**

- 本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元  
**中嶋生薬株式会社**  
京都市中京区二条通東洞院西入る仁王門町29-2

日本薬局方 センナ  
ナカジマ センナ

第②類医薬品

**使用上の注意**

してはいけないこと

- 本剤を服用中は他の下剤を服用しないこと。
- 授乳中の人は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳をさけること。
- 大量に服用しないこと。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談して下さい
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 激しい腹痛、悪心、嘔吐の症状がある人。
  - 体力の衰えている人。
  - 胃腸が弱くて下痢しやすい人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。
 

関係部位	症 状
皮膚	発疹、発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心、嘔吐

  - 一週間位服用しても症状がよくなる場合。
  - まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
- 下痢の症状が続いたりひどくなった場合は、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

服用の際は、用法・用量を守ってください。

**効能又は効果**

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：  
頭重、のぼせ、肌あれ、吹き出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔。

**用法及び用量**

大人(15歳以上)は、1日3～6gに熱湯約150mlを加えて15分間煮てかすを取り去り、なるべく寝る前1回服用する。

**保管及び取扱い上の注意**

- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入していますので、これを一緒に服用しないようにご注意ください。
- ご購入の際、万一異常がありましたら、お手数ですが、お知らせください。

京都市中京区二条通東洞院西入る仁王門町29番地の2  
製造発売元 中嶋生薬株式会社  
TEL. 075-231-2633

**副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931**