



日本薬局方 センナ末

ナカジマ センナ末 第②類医薬品

効能又は効果
便秘、便祕に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹き出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵等。

用法及び用量
大人（15歳以上）は1日1回、0.2～0.5gをなるべく寝る前に服用して下さい。（添付のサージー杯は約0.5gです。）

保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
- 開封をさせ、品質を保持するために他の容器に入れ替えないで下さい。
- 本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入していますのでご注意下さい。
- ご購入の際、万一異常がありましたら、お手数ですがお知らせ下さい。

京都府京都市二条通東洞院西入仁王門町29番地の2
製造販売元 中嶋生薬株式会社
TEL075-231-2633

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

使 用 期 限

日本薬局方 センナ末

ナカジマ センナ末 第②類医薬品

4 936246 100838

使用期限

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。

二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。

三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元 中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 センナ末
ナカジマ センナ末

第②類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと

- 本剤を使用中は他の下剤を服用しないで下さい。
- 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさせて下さい。
- 大量に服用しないで下さい。

相談すること

- 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 本人又は家族がアレルギー体质の人。

(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 激しい腹痛、悪心、嘔吐の症状のある人。

- 服用後、次の症状があらわされることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

下痢

- 一週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

定められた用法・用量を守り正しくお使いください

効能又は効果

便秘、便祕に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹き出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵等

用法及び用量

大人（15歳以上）は1日1回0.2～0.5gをなるべく寝る前に服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

①直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

②小児の手の届かない所に保管して下さい。

③誤用を避け品質を保持するために、他の容器に入れ替えないで下さい。

④本品は防虫、防カビのため脱酸素剤を封入していますので、これを一緒に煎じないようにご注意下さい。

⑤ご購入の際、万一異常がありましたらお手数ですがお知らせ下さい。

製造販売元：中嶋生薬株式会社 ☎ 075-231-2633

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931