



日本薬局方 ジュウヤク
ナカジマ ジュウヤク

第3類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
本剤を使用している間は、次の医薬品を服用しないこと。他の緩下剤（下剤）
相談すること

1. 服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 次の症状のある人。激しい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位：消化器 症状：激しい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

5. 1ヵ月位（便秘、便秘に伴う吹き出物に服用する場合は5～6日間）服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

定められた用法・用量を守り正しくお使いください

効能又は効果

便秘、尿量減少、便秘に伴う吹き出物。

用法及び用量

大人（15歳以上）は1日量15gを約600mLの水で約400mLになるまで煮詰め、滓をこして取り去り、食前又は食間3回に分けて服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光を避け、温湿の少ない涼しい所に保管して下さい。
- ②小児の手の届かない所に保管して下さい。
- ③誤用を避け品質を保持するために、他の容器に入れ替えないで下さい。
- ④本品は防虫・防カビのため脱酸素剤を封入していますので、これを一緒に煎じないようにご注意下さい。
- ⑤ご購入の際、万一異常がありましたらお手数ですがお知らせ下さい。

