

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。  
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

## 生薬配合便秘薬

じゅんどうがん

# 潤導丸

第②類医薬品

『潤導丸』は硬くなった便に水分を浸透させ軟化し、自然の排便を促す、ジオクチルソジウムスルホサクシネート(DSS)と、腸に刺激を与え、腸の蠕動を促進して排便を促すセンナ実を主剤とし、これに腹部の膨満感を改善する厚朴、その他、腸の働きを改善する芍薬、枳実を配合した自然に近いお通じを促す便秘薬です。

「快便」は健康にとって、とても大切な要素の1つです。また便秘は頭重、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満感など、全身的に様々な不快な症状を伴います。本剤は、便秘や、それに伴う不快な症状を改善する便秘薬です。また、若い方からご年配の方まで幅広くご使用頂ける便秘薬です。

### ⚠ 使用上の注意

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。  
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
3. 大量に服用しないで下さい。

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師等の専門家に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。  
下痢

### <成分・分量>

1日量(40丸)中

ジオクチルソジウムスルホサクシネート	150mg
センナジツ末	750mg
シャクヤク末	500mg
キジツ末	500mg
コウボク末	500mg

以上を蜜丸としたもの。

<効能・効果>

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

<用法・用量>

次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時に服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。但し、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量して下さい。

年 齢	1回量
成人（15歳以上）	10～20丸
11～14歳	6～12丸
7～10歳	5～10丸
3～6歳	3～6丸
3歳未満	服用しないこと

用法・用量についての注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないように、よく注意して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えしないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

材 質	分装期間
紙製、木製・金属	6 月
ガラス・小瓶、黒色PVC製	6 ヶ月

お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515  
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号