

2013年1月改訂

(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第②類医薬品

センナ・アロエ丸

SENNAROEGAN

便秘薬

センナ・アロエ丸は就寝時に服用しますと、翌朝には効果があらわれます。服用する間隔をのばしていくと、規則正しい排便の習慣をつけ、便秘による、肌あれ、吹出物、のぼせなどの解消に役立ちます。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

裏面もよくお読みください。

【成分・分量】本品20粒（15歳以上の1日最大服用量1.95g）中に

日本薬局方センナ……………1.20g

日本薬局方アロエ……………0.35g

添加物として、デキストリンを含有する。

【効能・効果】

便秘。便秘に伴う次の症状の緩和：頭痛、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔。

【用法・用量】

次の量を水またはお湯でかまずに服用してください。

| 年 齢 | 1回量 | 1日の服用回数 |
|---------|---------|-----------------------------|
| 15歳以上 | 8～10粒 | 1日2回、朝・夕の空腹時 （又は食前或いは食間） |
| 11歳～14歳 | 5～6粒 | |
| 7歳～10歳 | 4～5粒 | |
| 7歳未満 | 服用しないこと | |

ただし初回は最少量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量、又は減量すること。

（用法・用量に関する注意）

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)便通の改善がみられたら量を減らしてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。（天然の植物製剤のため吸湿し、カビが生えたり、虫がつくこともあります。）
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすててください。
（詰め物は丸剤の破損防止用です。）

本品についてのお問い合わせは下記迄ご連絡頂きますようお願いいたします。

日野薬品株式会社

フリーダイヤル 0120-898-004

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931

製造販売元

日野薬品株式会社

大阪府中央区道修町2-3-15

電話 06-6231-5847