

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

制定年月日 平成30年6月

第②類医薬品



和漢便秘薬

生薬由来成分からなり、便の排泄を高める緩下薬です

センナ葉=センナ末はぜんどう運動を強制的に起こすタイプの便秘薬ですが、和漢便秘薬配合センナ末は腸壁から微量の粘液を出して、剥がすように排便させる働きあり、センナ末より絞り腹を起こすことが少ない。また、センナ末は体を冷やすのに対し、センナ末のほうは体を温めます。

【使用上の注意】△

してはいけないこと ❶

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。
他の瀉下薬(下剤)
- 2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合授乳を避けること。
- 3.大量に服用しないこと。

相談すること ❷

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4)次の症状のある人
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
下痢
- 4.5～6日服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能又は効果】

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

【用法及び用量】

年 齢	1回量
15歳以上	10～20粒
11～14歳	7～13粒
7～10歳	5～10粒
7歳未満	服用しないこと

1日3回を限度とし、なるべく空腹時に服用すること。服用間隔は4時間以上おくこと。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

【用法及び用量に関する注意事項】

- 1.用法及び用量を厳守すること。
- 2.小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分及び分量】 1日最大服用量(60粒)中

センナ末	700mg	日局	ダイオウ末	650mg
マシニン末	650mg	日局	オウバク末	400mg
エンメイソウ末	250mg	日局	ゲンチアナ末	150mg
結合剤	米粉			

【成分・分量に関連する注意】

本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤褐色になることがあります。これはセンナ及びダイオウの成分によるものであり、異常ではありません。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
 - 2.小児の手の届かない所に保管すること。
 - 3.他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 本剤は天然生薬を原料としていますので、多少色調が異なることや、天然生薬色素により容器、包装資材等が黄味を帯びることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

〒639-3115 奈良県吉野郡吉野町吉野山2413番地

製造販売元 株式会社 藤井利三郎薬房

電話・お客様相談室 0746(32)3025

FAX 0746(32)3052

ホームページアドレス <https://www.darasuke.co.jp>

本品についてのお問い合わせ等は「お客様相談室」まで御連絡ください。