



ここからお切りください。

開封後はチャックを閉めて保存してください。



生薬のチカラで便秘を改善

べん づう じょう

弁通錠

新大和漢方株式会社



45錠

第②類医薬品

効能・効果

○便秘

○便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

用法・用量

次の量を、朝夕の空腹時（又は食前あるいは食間）に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	2～3錠	2回
15歳未満	服用しないでください	

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

用法・用量に関連する注意

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

1日量6錠（1錠325mg）中

アロエ末 …… 300mg
ダイオウ末 … 300mg
センナ末 … 600mg
カンゾウ末 … 150mg

添加物として、軽質無水ケイ酸、カルメロースCa、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mgを含有します。

✂ ここからお切りください。-----

開封後はチャックを閉めて保存してください。

ご使用の際には、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



第②類医薬品 新大和漢方 しんやまとかんぼう

内容量 45錠

販売名：弁通錠 べんつうじょう

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取り扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様窓口】(商品に関するご質問・お問い合わせ)

☎ 0120-702-866

(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独) 医薬品医療機器総合機構

☎ 0120-149-931

製造番号

【発 売 元】

新大和漢方株式会社

福岡県福岡市早良区干隈3-16-1

使用期限

【製造販売元】

美吉野製薬株式会社

奈良県吉野郡大淀町大岩692



開封後はチャックを閉めて保存してください。

生薬のチカラで便秘を改善

べんつうじょう

弁
通
錠

新大和漢方株式会社



180錠
(30日分)

第②類医薬品



ここからお切りください。-----

開封後はチャックを閉めて保存してください。

ご使用の際には、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



第②類医薬品 **新大和漢方** しんやまとかんぼう

内容量 180錠

販売名：弁通錠 べんつうじょう

(30日分)

⚠ 使用上の注意

❌してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

他の瀉下薬(下剤)

2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

3. 大量に服用しないでください

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

○便秘

○便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

用法・用量

次の量を、朝夕の空腹時(又は食前あるいは食間)に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	2～3錠	2回
15歳未満	服用しないでください	

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

用法・用量に関連する注意

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

1日量6錠(1錠325mg) 中

ア ロ エ 末	300mg
ダ イ オ ウ 末	300mg
セ ン ナ 末	600mg
カ ン ゾ ウ 末	150mg

添加物として、軽質無水ケイ酸、カルメロースCa、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mgを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様窓口】(商品に関するご質問・お問い合わせ)

☎ 0120-702-866

(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構

☎ 0120-149-931

【発 売 元】新大和漢方株式会社

福岡県福岡市早良区干隈3-16-1

【製造販売元】美吉野製薬株式会社

奈良県吉野郡大淀町大岩692



製造番号

使用期限