

第3類医薬品

服用に際して、説明文を必ずお読み下さい



スイマグ・エース

生まれは海、育ちは自然の医薬品

しゃげやく げざい せいさんやく
瀉下薬(下剤)・制酸薬

- スイマグ・エースは胃酸を抑え、便通を良くする薬です。
- 水と分離していますので、よく振り混ぜてからお使い下さい。

⚠ 使用上の注意

⊗【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、他の下剤を服用しないこと

👨🏻‍⚕️【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - ・医師の治療を受けている人
 - ・妊婦又は妊娠していると思われる人
 - ・激しい腹痛、はきけ・嘔吐の症状のある人
 - ・腎臓病の診断を受けた人
2. 服用後、激しい腹痛、はきけ・嘔吐の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 服用後、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 2週間位(下剤として用いる場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【用法及び用量】

＜瀉下薬（下剤）として＞

1日1回就寝前（又は空腹時）に服用して下さい。
但し、初回は最小量を用い便通の具合や状態を
みながら少しずつ増量又は減量して下さい。

15歳以上	1回 12～21mL
11歳以上15歳未満	1回 8～14mL
7歳以上11歳未満	1回 6～10.5mL
3歳以上7歳未満	1回 4～7mL
3歳未満	服用しないこと

＜制酸薬として＞

1日3回食前又は食間（食後2～3時間）に
服用して下さい。

15歳以上	1回 4mL
11歳以上15歳未満	1回 2.5mL
8歳以上11歳未満	1回 2mL
3歳以上8歳未満	1回 1mL
1歳以上3歳未満	1回 0.5mL
1歳未満	服用しないこと

適当に水で薄めて服用しますと飲み易く、又
有効です。計量カップ（キャップに目盛がつ
いています）1目盛が1mLです。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- ・定められた用法用量を厳守すること。
- ・小児に服用させる場合には、保護者の指導監
督のもとに服用させること。



株式会社 **三保製薬研究所**

〒424-0401 静岡県静岡市清水区中河内1513
TEL (054)396-3321 FAX (054)396-3371

お客様相談窓口 TEL (054)396-3375 (8:30～16:30)

↓使用期限及び製造番号は容器底部に表示してあります。

【効能又は効果】

＜瀉下薬（下剤）として＞

・便秘・便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、
吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

＜制酸薬として＞

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、
胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、
二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）、胃痛

【成分及び分量】

21mL中 水酸化マグネシウム 2.1g含有(10w/v%) 360mL



副作用救済制度

☎0120-149-931



ボトル：PE

キャップ：PP

外装フィルム：PET

保管及び取扱い上の注意

- ・ 冬期凍らないよう保管すること（凍ると変質します）
- ・ 使用後はキャップをきれいに洗いしっかり栓をすること
- ・ 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管すること
- ・ 小児の手の届かない所に保管すること
- ・ 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）