

山本漢方デトラクサート便秘薬(細粒)

山本漢方デトラクサート便秘薬(細粒)は、複数の有効成分を配合しており、プラントゴ・オバタ種皮末の食物繊維は腸内で水分を吸収して容積を増し、適度な硬さの便を作りセンナ実末の瀉下作用を助け、シャクヤク末はお腹の調子を保ち、不快な症状が起きにくくしかも作用は明確で自然に近いお通じを促す便秘薬です。

●販売名：山本漢方デトラクサート便秘薬(細粒)

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能又は効果】

- ・便秘。
- ・便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常發酵、痔

【用法及び用量】

次の量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時に服用すること。服用間隔は4時間以上おこなうこと。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1/2~1包	2回
11歳以上15歳未満	1/3~2/3包	
7歳以上11歳未満	1/4~1/2包	
3歳以上7歳未満	1/6~1/3包	
3歳未満	服用しないでください。	

【用法及び用量に関連する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (3) コップ1杯(約180mL)の水又はぬるま湯でおのみください。

【成分及び分量】 1日量 3.6g(2包)中

成分	分量	作用
プラントゴ・オバタ種皮末	2000mg	腸内で水分を吸収して容積を増し、適度な硬さの便を作ります。また腸のぜん動をうながして自然に近いお通じを誘います。
センナ実末	750mg	センナ実末には腸のぜん動運動を高める作用の成分が含まれ、排便をうながします。
日局 シャクヤク末	200mg	お腹の調子を保ち不快な症状を起きにくくします。

*添加物として乳糖水和物、L-メントール、バニリン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

【成分及び分量に関連する注意】

本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤色になることがありますが、これは主成分のセンノシドによるものですから心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、出来るだけ早く服用してください。
- (5) 使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

【お問い合わせ先】

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地
お問い合わせ ☎0568-73-3131
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日は除く)
ホームページアドレス <http://www.kanpo-yamamoto.com>

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造
販売元



山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

YAMAMOTO

山本漢方の

植物性便秘薬

ファイバーの力で腸内の老廃物、
滞留便をスムーズに排出



プラントゴオバタ



センナの実



シャクヤク

Detolaxart

デトラクサート 細粒

第②類医薬品

Ⓞ 山本漢方製薬株式会社

⚠ 使用上の注意**⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
 他の瀉下薬(下剤) 2.授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 3.大量に服用しないでください

**相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
- 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、出来るだけ早く服用してください。(5)使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

電 話 **0568-73-3131**

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日は除く)

http://www.kanpo-yamamoto.com

製造販売元

山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

販売名 山本漢方デトラクサート便秘薬(細粒)

効能又は効果

便秘。便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常發酵、痔

用法及び用量

次の量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時に服用すること。服用間隔は4時間以上おくこと。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1/2~1包	2回
11歳以上15歳未満	1/3~2/3包	
7歳以上11歳未満	1/4~1/2包	
3歳以上7歳未満	1/6~1/3包	
3歳未満	服用しないでください。	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (3) コップ1杯(約180mL)の水又はぬるま湯でおのみください。

成分及び分量

1日量 3.6g(2包)中

成分	分量	作用
プラントゴ・オバタ種皮末	2000mg	腸内で水分を吸収して容積を増し、適度な硬さの便を作ります。また腸のぜん動をうながして自然に近いお通じを誘います。
センナ実末	750mg	センナ実末には腸のぜん動運動を高める作用の成分が含まれ、排便をうながします。
シャクヤク末	200mg	お腹の調子を保ち不快な症状を起きにくくします。

*添加物として乳糖水和物、L-メントール、バニリン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

〈成分及び分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤色になることがありますが、これは主成分のセンノシドによるものですから心配ありません。

 YAMAMOTO

山本漢方の

植物性便秘薬

Detolaxart

デトラクサート 細粒

第②類医薬品

山本漢方デトラクサート便秘薬(細粒)は、複数の有効成分を配合しており、プラントゴ・オバタ種皮末の食物繊維は腸内で水分を吸収して容積を増し、適度な硬さの便を作りセンナ実末の瀉下作用を助け、シャクヤク末はお腹の調子を保ち、不快な症状が起きにくくしかも作用は明確で自然に近いお通じを促す便秘薬です。