

KOJIMA'S
HERB MEDICINE

日本薬局方

センナ

SENNA
500g

第②類医薬品

MA
KOJIMA
A KOJIMA
UUMA KOJIMA



株式会社 小島漢方
大阪市中央区常盤町2-2-19
TEL 06-6941-1643

K

用法及び用量

大人（15才以上）は1日量 1.5～3g を熱湯150mlを加え15分間煮た後、滓をこして取り去り、なるべく就寝前1回服用する。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しづつ增量又は減量する。

効能又は効果

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、痔



PP, PA

A standard linear barcode is located at the bottom right of the page. Below the barcode, the numbers "4 993512 240636" are printed.

IMA

▲使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- ・本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下剤（下剤）
- ・授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- ・大量に服用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢

4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

□保管及び取扱い上の注意

- ・小児の手の届かない所に保管してください。
- ・直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- ・本品は天産品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には十分ご注意ください。
- ・誤用を避け、品質を保持するため他の容器に入れ替えないでください。
- ・本品には品質保持(カビ・虫害防止)のため季節により脱酸素剤を入れる事があります。開封後は高温多湿を避け、なるべくお早めにご使用ください。
- ・脱酸素剤はお召し上がりなきようお願い致します。

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

LOT

706504