

日本薬局方

ダイオウ末



4 993512 310834

500 g

第2類医薬品

LOT 707005 p



日本薬局方
ダイオウ末

《用法及び用量》

大人(15才以上)は1日0.75～1.5gをなるべく就寝前に服用する。
ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ
増量又は減量する。

《効能又は効果》

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、痔
(添付サジー杯 約0.5g)



4 993512 310834

LOT 707005 p

500 g

第2類医薬品

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

株式
会社

小島漢方

大阪市中央区常盤町2-2-19

TEL 06-6941-1643

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと❌

- ・本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の瀉下剤(下剤)
- ・授乳中の方は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けてください。
- ・大量に服用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発 疹 ・ 発 赤 、 かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますのでこのような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

□ 保管及び取扱い上の注意 □

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 本品は天産品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には十分ご注意ください。
- 誤用を避け、品質を保持するため他の容器に入れ替えないでください。
- 本品には品質保持(カビ・虫害防止)のため季節により脱酸素剤を入れる事があります。開封後は高温多湿を避け、なるべくお早めにご使用ください。
- 脱酸素剤はお召し上がりなきようお願い致します。