

第②類医薬品

# 日本薬局方 センナ トチモトのセンナP (刻) 500g



製造番号  
使用期限

## 【使用上の注意】

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください

## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 次の症状のある人。 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位   | 症 状                         |
|--------|-----------------------------|
| 皮膚(ひふ) | 発疹・発赤、かゆみ                   |
| 消化器    | はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛をともなう下痢 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢、腹痛
4. 1週間間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：吹出物、のぼせ、痔

【用法・用量】 大人(15歳以上)は1日量3～6gに熱湯約150mlを加え、15分間煮た後に滓をこして取り去り、なるべく就寝前1回に服用してください。  
・定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

〔脱酸素剤入〕 913220

株式会社 橋本天海堂

副作用被害救済制度

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730

☎ 0120-149-931