

使用に際して、この説明文書をよく読むこと。
必要な時に読めるように大切に保管すること。

昭和 便秘のおくすり

第2類医薬品

効能・効果

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

用法・用量

大人（15歳以上）は、1回に1包の1/2量～全量をなるべく就寝前、又は空腹時に服用する。1日2回を限度とし、服用間隔は4時間以上おくこと。

ただし、小児用量は、

11歳以上15歳未満は、大人の2/3

7歳以上11歳未満は、大人の1/2

3歳以上7歳未満は、大人の1/3です。

なお、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

服用時のアドバイス

水又はぬるま湯でお飲みください。服薬用ゼリーでお飲みいただいてもかまいません。

水や、ぬるま湯で
就寝前や空腹時に
1包の1/2量～全量を



服薬用ゼリーで
飲むと飲みやすくな
ります。

用法・用量に関する注意 1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
2. 3歳未満の幼児には服用させないこと。

成分・分量 1日量2包(3.33g)中

内容量 21包

日局 ダイオウ末 : 2.0g
日局 シャクヤク末 : 1.0g
日局 ショウキョウ末 : 0.33g

△使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。
・他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。
3. 大量に服用しないこと。

⊙ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる婦人
(3) 薬などにより、アレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 次の症状のある人
はげしい腹痛、吐き気、嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるため直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気、嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
下痢
4. 1週間くらい服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

保管・取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管すること。開封後は冷蔵庫に入れることを勧めます。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと。

【副作用被害救済制度のお問合せ先】

(独) 医薬品医療機器総合機構

☎ 0120-149-931

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

お客様相談室

0800-080-7871

祝日・土・日を除く午前10:00～午後4:00

製造販売

昭和製薬株式会社

〒441-3124

愛知県豊橋市寺沢町寺瀬戸65番地の2

※本剤中に細い繊維状のものを見つけることがありますが、これは配合したショウキョウ(生姜)の繊維ですから異物ではありません。ご安心ください。