

チャック（開封後はチャックをしっかり閉じて保管してください）

第3類医薬品

水のチカラでおなかキレイ

非刺激性でクセになりにくい！

酸化マグネシウムの便秘薬

アストルベン[®]錠

400錠



成分分量

6錠中 酸化マグネシウム 2,000mg を含有

添加物：セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Ca、L-メントール

効能効果

○便秘

○便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、
食欲不振、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

用法用量

成人（15歳以上） 1回2～3錠

11歳以上15歳未満 1回1～2錠

1日2回朝夕の空腹時又は食前あるいは食間に服用してください。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量
又は減量してください。

（11歳未満は服用しないでください。）

用法・用量に
関連する注意

（1）用法・用量を厳守してください。

（注意事項は裏面も参照）

（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
☎0120-149-931（フリーダイヤル）

商品についてのお問い合わせ先

（1）本製品の購入店

（2）日本ダルム株式会社 お客様相談室

電話 011-642-9333

9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

アストルベン錠は腸への強い刺激を伴わず、浸透圧の作用で腸内に水を溜め込み、滞っている便を柔らかくして排泄させます。

また、海水から抽出されたマグネシウムを焼成して作り上げた、おなかにやさしいミネラル便秘薬です。

® 登録商標

発売元  日本ダルム株式会社

北海道札幌市西区二十四軒2条4丁目2-11-112

製造販売元  佐藤薬品工業株式会社

奈良県橿原市観音寺町9番地の2



キリトリ線（開封後はチャックを閉じて保管してください。）

第3類医薬品

便秘薬 **アストルベン[®]** 錠



使用上の注意



してはいけないこと

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
- 1、本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）



相談すること

- 1、次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 次の症状がある人。はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
(5) 次の診断を受けた人。腎臓病
- 2、服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
精神神経系	強い眠気、意識がうすれる
循環器	立ちくらみ、脈が遅くなる
呼吸器	息苦しい
その他	筋力の低下、口のかわき

- 3、服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 4、1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。
- (2) 小児の手に届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) このお薬を飲み終えるまで、この袋（使用上の注意書き）は保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

81F1



※ 水、ぬるま湯はコップ7～8分目くらいの量で服用してください。

製造番号

使用期限

