

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

緩下剤

# ラックスタイマー錠S

使用説明書

- ◇緩下剤ラックスタイマー錠Sは腸溶錠ですので胃では溶けず、腸で初めて溶け、胃に負担をかけずに腸のぜん動を促します。排便を起こす成分を主薬に、便秘に伴う肌あれ、吹出物などに効果のあるヨクイニンエキスを含有しています。
- ◇服用はコップ1杯の水と共に初回は必ず最少量(1錠)を用い、便通の具合や状態をみながら増量してください。
- ◇服用してから約6～8時間後に効果があらわれますが、場合により、これより少し早くなったり、遅くなることがあります。効果があらわれるとき、腹痛を感じる場合がありますが、これは今まで止まっていた腸のぜん動が開始されたことによりますのでトイレで排便をしてください。

**!**【使用上の注意】

**⊗**してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。

**👤**相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4)次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
- ※(5)次の診断を受けた人。  
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

便秘。便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔。

【用法・用量】

次の量を1日1回就寝前(又は空腹時)に服用してください。  
ただし初回は最少量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年 齢	成人(15歳以上)	7歳以上15歳未満	7歳未満
1回量	1錠～4錠	1錠～2錠	服用しないでください

【用法・用量に関連する注意】

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)定められた用法・用量を厳守してください。
- (3)服用時はなるべくコップ1杯の水とともに錠剤を服用してください。

【成分・分量】4錠中

ピサコジル……………15mg  
センノサイド・カルシウム……………40mg  
ヨクイニンエキス……………210mg  
(ヨクイニンとして2730mgに相当)

添加物として、バレイショデンプン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、グリセリン脂肪酸エステル、ヒプロメロースフタル酸エステル、ゼラチン、アラビアゴム末、白糖、沈降炭酸カルシウム、タルク、酸化チタン、カルナウバロウ、黄色5号、赤色3号を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

商品のお問い合わせはお買い求めの薬局、薬店又は下記をお願いします。

発売元・お問い合わせ先 <b>松本製薬工業株式会社</b> TEL 0748-88-3196 受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く) 〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場160	製造販売元 <b>松本製薬工業株式会社</b> 〒635-0143 奈良県高市郡高取町車木323-1
---	--

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎0120-149-931 (フリーダイヤル)