第②類医薬品 センナプラスダイオウ錠OR

- /\使用上の注意・

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬(下剤)
- 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
- 3. 大量に服用しないこと

鯔 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

 - (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。

はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中 止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談するこ

関係部位	症 状	
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐	

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見 られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相 談すること

下痢

4.1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談すること

《効能又は効果》

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和:

頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔、食欲不振(食欲減退)

《用法及び用量》

1日2回朝夕の空腹時に、水又は白湯にて服用してください。 ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1~3錠	2回
15歳未満	服用しないこと	

《成分及び分量》

センナプラスダイオウ錠ORの1日量(6錠中)に含まれる成分及び分量は以下のとおりです。 センナ末 ………… 1,000 mg ダイオウ末 ………… 450 mg 添加物として、クロスカルメロースNa、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する。

〈成分及び分量に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄褐色又は赤褐色になることがありますが、これはセンナ末及びダイ オウ末の成分によるものであり、異常ではありません。

《保管及び取扱上の注意》

- (1) 直射目光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 本剤は天然物(生薬)を原料としているため、製品の色調、味又は香り等に多少の差異が でることがありますが、効果には変わりありません。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

------ お問い合わせ先 ------

OJAS PHARMA株式会社「消費者相談窓口」 奈良県五條市住川町1321 〒637-0014 話:0747-23-2424

受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 OJAS PHARMA 株式会社