

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第②類医薬品

# TRANSIT

トランジット

## 植物性便秘薬



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4)次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

### 便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

## 【用法・用量】

次の量を1日2回朝夕の空腹時にコップ一杯の水又はお湯と一緒に服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

- ・成人(15歳以上)1回 1/2～1包

定められた用法、用量を厳守してください。

## 【成分・分量】

1日量2包(1包2.5g)中

・プラントゴ・オバタ種皮末	3.865g
・センナ実末	0.500g
・ダイオウエキス (原生薬換算4.0g)	0.400g

添加物として粉糖、カラメル、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ヒドロキシプロピルセルロース、香料を含有します。

### 〈保管及び取扱い上の注意〉

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。



- (誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
4. 1包を分割して服用した後、残りを保管し、続けて服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
  5. 生薬を原料として製造していますので製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。

製造販売元 **フィbro製薬株式会社**  
東京都足立区谷在家3-10-6

————— 消費者相談窓口 —————  
TEL: 03(3855)7011

受付時間:9時から18時まで(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は上記消費者相談窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

FIBRO