



酸化マグネシウムの **便秘薬**

# ビーマス<sup>®</sup> 速溶錠



すぐ溶ける



お腹への  
刺激が少なく  
お腹に  
やさしい

固い便を  
水状でなく  
ほどよい  
柔らかさに  
します

第3類医薬品

酸化マグネシウムの **便秘薬**

# ビーマス<sup>®</sup>s速溶錠

開  
け  
口

すぐ溶ける



第3類医薬品

販売名：ビーマスs

## 特長

1. お腹への刺激が少なく、お腹にやさしい。
2. 固い便を水状でなく、ほどよい柔らかさにします。
3. 寝る前に飲めば、朝に排便するリズムがもどります。
4. 天然の海水から作った酸化マグネシウムの便秘薬で、5歳のお子様からお年寄りまで服用できます。
5. クセになりにくく、効果の落ちにくい便秘薬です。
6. 水と一緒に飲めば、口の中ですぐに溶ける速溶錠なので、服用が簡単です。
7. 効果がなければ翌日から増やして飲めます。きつい便秘には1回6錠まで増量して飲むことが可能です。

**用法・用量** 次の1回量を1日1回、就寝前(又は空腹時)にコップ1杯の水又はぬるま湯で服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年齢	成人(15歳以上)	11~14歳	7~10歳	5~6歳	5歳未満
1回量	3~6錠	2~4錠	2~3錠	1~2錠	使用しないこと

**飲み方の補足** コップ2~3杯の多めの水又はぬるま湯と一緒に飲むとより効果的です。服用後、便が水状になったら効き過ぎですので、次回から少しずつ減量して飲んでください。

**用法・用量に関連する注意** (1) 用法・用量を厳守してください。(2) 錠剤の取り出し方 右図のように、錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)(3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。



**効能** 便秘・便秘に伴う次の症状の緩和：腹部膨満、腸内異常醗酵、肌あれ、吹出物、痔、食欲不振、頭重、のぼせ

販売  
**日本臓器製薬株式会社**  
大阪市中央区平野町2-1-2

製造販売元  
**協和化学工業株式会社**  
香川県木田郡三木町井上2876-2

お客様相談窓口 ☎06・6222・0441  
土・日・祝日を除く 9:00~17:00

副作用被害救済制度 ☎0120・149・931

**▲使用上の注意** **☒してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 本剤を服用している間は、他の瀉下薬(下剤)を服用しないでください。

**■相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人(3) 高齢者(4) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐のある人(5) 腎臓病の診断を受けた人 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 消化器：はげしい腹痛、吐き気・嘔吐(2) 精神神

経系：強い眠気、意識がうすれる(3) 循環器：立ちくらみ、脈が遅くなる(4) 呼吸器：息苦しい(5) その他：筋力の低下、口のかわき  
3. 服用後、下痢があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## 成分・6錠中

### ●酸化マグネシウム……1980mg

水分を腸内に集め、固い便を水状でなく、ほどよい柔らかさにします。体がもともと持っている排便作用に近い作用を示す便秘薬です。

### ●添加物：結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸カルシウム

**保管及び取扱い上の注意** (1) 直接日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても内袋を一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。