

年齢にあったものをお使い下さい。

12才以上	▶ 30g 40g
6才以上12才未満	▶ 20g
1才以上6才未満	▶ 10g
1才未満	▶ 10gの半量

立位(立たせた状態・中腰)での使用は避けて下さい。

使用上の注意 ⚠

してはいけないこと

連用しないで下さい。(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになります。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
 - (3) 1歳未満の乳児。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病
2. 2～3回使用しても排便がない場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

その他の注意

次の症状があらわれることがあります。
立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限(底面に記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。

お問い合わせ先(お客様相談室)

03-3829-8214
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

(独)医薬品医療機器総合機構

副作用救済制度
☎0120-149-931

ご使用の前に、この箱の説明文をよくお読み下さい。また、必要な時に読めるように保管して下さい。

効能・効果

便秘

成分・分量 本品1個(10g)中

日局グリセリン…5.00g 添加物…ベンザル
コニウム塩化物含有。溶剤…精製水使用。

用法・用量

1歳以上6歳未満1回1個(10g)
1歳未満1回1個の約半量(5g)

を直腸内に注入して下さい。それで効果の
みられない場合には、さらに同量をもう一
度注入して下さい。

約半量(5g)の量り方…容器の中程を2本の指で軽く
押し両指先が当たるまで注入して下さい。
なお、残りの液は衛生上の問題から廃棄して下さい。
[2本目をご使用の際は、1時間あけた方が
効果的です。]

用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんして下さい。(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4) 特に乳幼児の場合には安易な使用を避け浣腸にたよりすぎないように注意して下さい。
- (5) 無理に挿入すると直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意して下さい。
- (6) 冬季は容器を温湯(40℃位)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。
- (7) 浣腸にのみ使用して下さい。(内服しないで下さい。)

製造販売元

イチジク製薬株式会社
東京都墨田区東駒形 4-16-6


イチジク浣腸の使い方

- 1 容器のノズルを
しっかり持ちキャップ
をまわしながら引き
上げて下さい。



挿入しにくい時は、ノズルを真上に
向け薬液を少し出し先端周囲を
ぬらして下さい

- 2 ノズルをゆっくりと肛門に挿入
し、ゆっくり薬液を注入し
ます。注入後、容器
を押したままノズ
ルを肛門から抜き
ます。



- 3 肛門部分にティッシュをあて
しばらく待ってから排便さ
せて下さい。



詳しい使用方法是
イチジク製薬のホームページを
ご覧下さい。

かんちょう
イチジク浣腸®



10

医療用と同一
有効成分配合

10g

赤ちゃん～5才

今すぐに出したい
お子様の便秘に。

第2類医薬品