

本情報は箱に表示されております。

ご使用前に、この説明文(外箱に表示)をよくお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

平成23年12月

第2類医薬品

リセッチ

特徴

飲まない便秘の薬。



使用上の注意



してはいけないこと

連用しないで下さい。

(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになります。)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者。
- (4) 次に症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血
- (5) 次に診断を受けた人。
心臓病。

2. 2~3回使用しても排便がない場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

その他の注意

次の症状があらわれることがあります。

立ちくらみ、肛門部の熱感、腹痛、不快感

効能・効果

便秘

用法・用量

12歳以上 1回1個(30g)を直腸内に注入して下さい。

それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入して下さい。

[2本目を使用の際は、1時間あけた方が効果的です。]

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんして下さい。
(使用後すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
- (3) 12歳未満の小児には、使用させないで下さい。
- (4) 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意して下さい。
- (5) 冬季は容器を温湯(40℃位)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。
- (6) 浣腸にのみ使用して下さい。(内服しないで下さい。)

【リセットの使い方】



成分・分量

本品 1 個(30g)中 日局グリセリン……………15. 00g

添加物…ベンザルコニウム塩化物含有。 溶剤…精製水使用。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】 30g×4コ入

お問い合わせ先

イチジク製薬株式会社 お客様相談室

電話番号： 03-3829-8214(直通)

受付時間： 9時～17時 (土、日、祝日を除く)



(独) 医薬品医療機器総合機構
副作用救済制度
☎ 0120-149-931

早く効く

待つ目安は3分～10分



植物由来の

日局グリセリン使用

飲まない、便秘のお薬。

Resetch
リセッチ



(浣腸薬)

【使用上の注意】 ⚠

■ してはいけないこと ☒

連用しないで下さい。

(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになります。)

■ 相談すること ■

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者
- (4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血
- (5) 次の診断を受けた人。
心臓病

- (3) 高齢者
 - (4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血
 - (5) 次の診断を受けた人。
心臓病
2. 2～3回使用しても排便がない場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

■ その他の注意

次の症状があらわれることがあります。
立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) **使用期限(底面に記載)**を過ぎた製品は使用しないで下さい。

(独)医薬品医療機器総合機構

副作用救済制度

☎ 0120-149-931

(Made in Japan)

第2類医薬品

Resetch

リセッチ

OPEN

リセッチの使い方

1

キャップをはずす

容器のキャップを
ねじりながら、
静かに抜いてください。



2

薬を入れる

ノズルをおしりに
挿入し、容器を
ゆっくり押しつぶして
薬液を注入します。



3

しばらく待つ

目安として、
3分から10分待ち、
便意が十分に
強まってから
排便してください。



*効果や時間は、個人や症状により差があります。

直腸付近の硬結便をスムーズに排出

(イメージ図)



リセッチの作用

直腸付近の粘膜を刺激して
排便を促す。

詳しい使い方
はこちら



ご使用前に、この箱の説明文を
よくお読み下さい。また、必要な
時に読めるように保管して下さい。

【効能・効果】便秘

【成分・分量】 本品1個(30g)中
日局グリセリン…15.00g 添加物…ベンザル
コニウム塩化物含有。 溶剤…精製水使用。

【用法・用量】 12歳以上 1回 1個(30g)を
直腸内に注入して下さい。それで効果のみられない
場合には、さらに同量をもう一度注入して下さい。
※2本目をご使用の際は、1時間あけた方が効果的です。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらく
がまんして下さい。(使用後、すぐに排便を
試みると薬剤のみ排出され、効果がみられ
ないことがあります。)
- (3) 12歳未満の小児には、使用させないで下さい。
- (4) 無理に挿入すると直腸粘膜を傷つける
おそれがあるので注意して下さい。
- (5) 冬季は容器を温湯(40℃位)に入れ、体温
近くまで温めると快適に使用できます。
- (6) 浣腸にのみ使用して下さい。(内服しないで下さい。)

お問い合わせ先(お客様相談室)

03-3829-8214

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



イチジク製薬株式会社

東京都墨田区東駒形 4-16-6

第2類医薬品