



30 ケンイー・浣腸

第2類医薬品

【成分分量】
白陶、グリセリン 50%
添加物：ベンザルコニウム塩化物
【効能効果】
便秘

〈キャップ式〉

30g×10個入

ケンイー・浣腸

第2類医薬品

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkou/iseai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

30g×10個入

30g×10個入

ケンイー・浣腸

第2類医薬品

ケンイー・浣腸

第2類
医薬品

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

使用上の注意

△ 使用しないこと

適用しないでください〔常用すると、効果が減弱し(いわゆる「なれ」が生じ)薬剤にたよりがちになります。〕

■ 相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
 - (3) 高齢者。
 - (4) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
 - (5) 心臓病の診断を受けた人。
2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがあります。

【用法用量】

12歳以上 1回1個(30g)を直腸内に注入してください。
効果のみられない場合にはさらに同量をもう一度注入してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 本剤使用後は、便秘が強まるまで、しばらくがまんしてください。
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果があられないことがあります。)
- (3) 小児ご使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 注入に際し、無理に挿入すると直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
- (5) 洗腸のみを使用してください。

【便秘しがちな人のために】

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけましょう。また、便秘をもよおしたときは、がまんせずトイレにいざましょ。
2. 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけましょう。
(例：野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など。)
3. 適度な運動、腹部マッサージなどを行うよう心がけましょう。
4. 早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳等を飲むと便秘をもよおしやすくなります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

健栄製薬株式会社
大阪府中央区伏見区 日本橋5号
電話番号 05(623)15625

30g×10個入

ケンイー・浣腸

第2類医薬品

製造番号
使用期限



2501

CV30-10 1305



Glycerin Enema
グリセリン浣腸剤
ケンエー・浣腸



浣腸

グリセリン浣腸剤

とてもつらい便秘に

第2類医薬品

〈キャップ式〉

第2類医薬品

ケンエー・浣腸

こんな方におすすめ

- とてつらい便秘にお困りの方
- はやく排便したい方
- 12歳以上の方に



使用上の注意



してはいけないこと

連用しないでください〔常用すると、効果が減弱し（いわゆる“なれ”が生じ）薬剤にたよりがちになります。〕



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
（流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。）
 - (3) 高齢者。
 - (4) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
 - (5) 心臓病の診断を受けた人。
2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがあります。

【効能効果】

便秘

【用法用量】

- 12歳以上 1回1個（30g）を直腸内に注入してください。
効果のみられない場合にはさらに同量をもう一度注入してください。
＜用法用量に関連する注意＞
(1) 用法用量を厳守してください。

開 封 口 押し開ける



- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんしてください。（使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。）
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 注入に際し、無理に挿入すると直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
- (5) 浣腸にのみ使用してください。

【成分分量】

日局 グリセリン 50%

添加物：ベンザルコニウム塩化物

【便秘しがちな人のために】

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけましょう。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレにいきましょう。
2. 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけましょう。
（例：野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など。）
3. 適度な運動、腹部マッサージなどを行うよう心がけましょう。
4. 早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

matsu
kiyo

For severe constipation.

For when you want to move your bowels promptly.

Glycerin Enema

とてもつらい便秘に

浣腸

〈キャップ式〉

グリセリン浣腸剤

第2類医薬品

ケンエー・浣腸

製造販売元：健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5822

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)