

4 987014 062506



副作用被害救済制度
☎0120-149931



ビワ湖浣腸10

第2類医薬品

10g×3



第2類医薬品

ビワ湖浣腸10

使用
期限

製造
番号

使用に際しては、使用上の注意をよくお読み下さい。

【使用上の注意】

してはいけないこと

連用しないでください(常用すると、効果が減弱し(いわゆる「なれ」が生じ)薬剤にたよりがちになります。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 1才未満の乳児。
- (4) 高齢者。
- (5) はげしい腹痛、悪心・嘔吐、痔出血のある人。

(6) 心臓病の診断を受けた人。

2次の場合は、使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 2～3回使用しても排便がない場合。

【その他の注意】

たちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

発売元 **オールジャバンドラッグ株式会社**

製造販売元 **伊丹製薬株式会社** 滋賀県高島市今津町下弘部280番地 ☎0740(22)2059

- 【効能・効果】 便秘
【成分・分量】 日局グリセリン……………50%
添加物として塩化ベンザルコニウムを含有します。
【用法・用量】 1才以上6才未満：1回1個(10g)を直腸内に
注入してください。1才未満：容器の中央部分を徐々に押し
中央部分のみが軽く接触する所まで押しつぶし約半量(5g)
を直腸内に注入してください。それで効果のみられない場
合には、さらに同量をもう一度注入してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんしてく
ださい。(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、
効果がみられないことがあります。)
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用
させてください。
- (4)特に乳児用の場合には、安易な使用を避け、浣腸にたより
すぎないように注意してください。
- (5)浣腸にのみ使用してください。

【使用法】

- (1)容器先端のキャップを取りはずし、肛門部へなるべく深く
挿入します。(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し
出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。)
- (2)容器をおしつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。
- (3)薬液注入後、十分便意が強まってから排便してください。
●無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので
注意してください。
●冬期は容器を温湯(40℃)に入れ、体温近くまで温めると快
適に使用できます。

【便秘しがちな方のために】

- 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をき
めて、一定時間トイレに入るよう心がけましょう。また、
便意をもよおしたときは、がまんせずトイレにいきましょう。
- 繊維質の多い食物と水分を多くとるよう心がけましょう。
(例：野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻等)
- 適度な運動、腹部マッサージ等を行うよう心がけましょう。
- 早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳等を飲むと便意をもよ
おしやすくなります。

ピワ湖浣腸10

第2類医薬品

10g × 3

