



30g

徳用

10個入

長めのノズルで使いやすい

ピワ湖[®]浣腸30

対象年齢 12才以上

第2類医薬品



第2類医薬品



30g

徳用

10個入

長めのノズルで使いやすい

ピワ湖[®]浣腸30

つらい便秘に

対象年齢 12才以上

第2類医薬品



ピワ湖[®]浣腸30

徳用

製造販売元

伊丹製薬株式会社
滋賀県高島市今津町下弘部280番地
お客様相談室 ☎ 0740-22-2059
受付時間：9時～16時30分(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



ミックス
パッケージ | 責任ある
森林管理を支えています
FSC® C111644



バイオマス
使用部位：印刷インキ
No.190146



第2類医薬品

ビワ湖[®]浣腸30

徳用

使用期限:

製造番号:

押し開けて下さい

使用に際しては、使用上の注意をよくお読みください。

【効能・効果】 便秘

【成分・分量】 日局グリセリン……………50%
添加物としてベンザルコニウム塩化物を含有します。

【用法・用量】

12才以上1回1個(30g)を直腸内に注入してください。
それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんしてください。(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
- (3) 12才未満の小児には使用させないでください。
- (4) 浣腸にのみ使用してください。

【使用法】

- (1) 容器先端のキャップを取りはずし、肛門部へなるべく深く挿入します。(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。)
- (2) 容器をおしつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。
- (3) 薬液注入後、十分便意が強まってから排便してください。
 - 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
 - 冬期は容器を温湯(40℃)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

【便秘しがちな方のために】

- 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて、一定時間トイレに入る心がけましょう。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレに行きましょう。

- 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけましょう。(例:野菜類、果物、こんにゃく、カンテン、海藻等)
- 適度な運動、腹部マッサージ等を行うよう心がけましょう。
- 早期、起きがけに冷たい水又は牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなります。

【使用上の注意】

してはいけないこと

運用しないでください。(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになります。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
 - (3) 高齢者。
 - (4) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
 - (5) 心臓病の診断を受けた人。
2. 2~3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

徳用

30浣腸
g×10個入

第2類医薬品

徳用

30浣腸
g×10個入

第2類医薬品

製造販売元
伊丹製薬株式会社

滋賀県高島市今津町下弘部280番地

お問い合わせ先
お客様相談室 ☎ 0740(22)2059
受付時間:9時から16時30分まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149931



販売名：ピワ湖洗腸30

押して開けて下さい

第2類医薬品

使用に際しては、使用上の注意をよくお読み下さい。

【功能・効果】 便秘

【成分・分量】 日局グリセリン 50%
添加物としてベンザルコニウム塩化物を含有します。

【用法・用量】

12才以上1回1個(30g)を直腸内に注入して下さい。
それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入して下さい。

【用法・用量に関する注意】

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんして下さい。(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
- (3)12才未満の小児には使用させないでください。
- (4)洗腸にのみ使用して下さい。

【使用法】

- (1)容器先端のキャップを取りはずし、肛門部へなるべく深く挿入します。(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。)
- (2)容器をおしつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。
- (3)薬液注入後、十分便意が強まってから排便して下さい。
 - 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意して下さい。
 - 冬期は容器を温湯(40℃)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

【便秘しがちな方のために】

- 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて、一定時間トイレに入るよう心がけましょう。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレに行きましょう。

- 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけましょう。(例：野菜類、果物、こんにゃく、カンテン、海藻等)
- 過度な運動、腰部マッサージ等を行うよう心がけましょう。
- 早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなります。

【使用上の注意】

してはいけないこと

連用しないでください。(常用すると、効果が減弱し(いわゆる「なれ」が生じ)薬剤にたよりがちになります。)

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
 - (3)高齢者。
 - (4)はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
 - (5)心臓病の診断を受けた人。
- 2.2〜3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【その他の注意】

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

使用期限:

製造番号:

第2類医薬品

ピワ湖[®]浣腸₃₀

30g x 12

徳用



ピワ湖[®]浣腸₃₀

ピワ湖[®]浣腸₃₀

第2類医薬品



外装フィルム:PE

30g x 12

徳用



第2類医薬品

ビワ湖[®]浣腸30

第2類医薬品

使用期限：

製造番号：

押し開けて下さい

使用に際しては、使用上の注意をよくお読み下さい。

【効能・効果】 便秘
【成分・分量】 日局グリセリン 50%
添加物としてベンザルコニウム塩化物を含有します。

【用法・用量】
12才以上1回1個(30g)を直腸内に注入して下さい。
それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入して下さい。

【用法・用量に関する注意】

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんして下さい。(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
- (3)12才未満の小児には使用しないでください。
- (4)完腸にのみ使用して下さい。

【使用法】

- (1)容器先端のキャップを取りはずし、肛門部へなるべく深く挿入します。(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。)

- (2)容器をおしつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。
- (3)薬液注入後、十分便意が強まってから排便して下さい。
●無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意して下さい。

- 冬期は容器を室温(40℃)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

【便秘しがちな方のため】

- 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて、一定時間トイレに入る心がけましょう。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレにいきましょう。
- 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけまし

よう。(例：野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻等)

- 過度な運動、顔部マッサージを行うよう心がけましょう。
- 早朝、起床に冷たい水又は牛乳等をのむと便意をもよおしやすくなります。

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

適用しないで行ってください。(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになります。)

【相談すること】

1次の方は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3)高齢者。
- (4)けいれい、腹痛、吐き気、嘔吐、痔出血のある人。
- (5)心臓病の診断を受けた人。

22~3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。


【その他の注意】

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

副作用被害救済制度
☎ 0120-149931

製造販売元  伊丹製薬株式会社
滋賀県彦根市今津町下弘部2-8-0 薬研
お客様相談室 ☎ 0740-22-0059
受付時間：9時~16時30分(土、日、祝日を除く)