

ご使用前に、この説明文をよくお読みください。
また必要な時に読めるように保管してください。


平成 29 年 3 月改訂

第 2 類医薬品

ミカサ浣腸 A-33

(情報は小箱に直接記載)

 **【使用上の注意】**

 **【してはいけないこと】**

連用しないでください。 (常用すると、効果が減弱し (いわゆる“なれ”が生じ) 薬剤にたよりがちになる。)

 **【相談すること】**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(流早産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者
- (4) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人
- (5) 心臓病の診断を受けた人

2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【その他の注意】

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがあります。

【効能・効果】 便秘

【用法・用量】

12歳以上1回1個(3.3g)を直腸内に注入します。
それで効果のみられない場合は、さらに同量をもう一度注入してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまでしばらくがまんしてください。
(使用後すぐに排便を試みると、薬剤のみが排出され、効果がみられないことがあります。)
- (3) 12歳未満の小児には、使用させないでください。
- (4) 浣腸にのみ使用してください。(内服しないでください。)

[使用方法]

- ① 容器先端のキャップを取りはずし、肛門部へなるべく深く挿入します。
(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。)
- ② 容器を押しつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。
- ③ 薬液注入後、充分便意が強まってから排便してください。
 - 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
 - 冬季は容器を温湯(40℃位)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

[便秘しがちな方のために]

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけましょう。
また、便意をもよおした時は、がまんせずトイレに行きましょう。
2. 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけましょう。
(例：野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など)
3. 適度な運動、腹部マッサージなどを行うよう心がけましょう。
4. 早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳などを飲むと、便意をもよおしやすくなります。

[成分・分量]本品1個(33g)中

日局 グリセリン・・・・・・・・ 16.5g
添加物として ベンザルコニウム塩化物含有

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

[包装]

33g×2個入り、33g×10個入り

製造販売元



ムネ製薬株式会社

兵庫県淡路市尾崎 859

電話：0120-85-0107

受付時間：8:30～15:00(土日祝を除く)

<http://www.mune-seiyaku.co.jp>

日本製

副作用救済制度
電話：0120-149-931

第2類医薬品
ミカサ浣腸A-33
33g×2コ入
Mikasa Enema

33
植物
由来の
グリセリン

ミカサ浣腸A-33
33g×2コ入

第2類医薬品

新薬株式会社
兵庫県淡路市海崎559 電話 0120-85-0107
受付時間 8:30～17:00(土日祝を除く)
http://www.mitsu-seiyaku.co.jp



使用期限/製造番号

【販売名】ミカサ浣腸A-33
【内容量】本剤1箱33g
【性状】液状
【用法・用量】12才以上18歳未満は1回1コを直腸内に挿入し、排便するまで直腸内に留め、排便後、残液を洗い流す。
18歳以上22歳未満は、2コを直腸内に挿入し、排便するまで直腸内に留め、排便後、残液を洗い流す。
【成分】グリセリン、水、クエン酸、香料、着色料、保存料、界面活性剤、緩衝剤、pH調整剤、香料、着色料、保存料、界面活性剤、緩衝剤、pH調整剤

新2類医薬品

922125-A
1

この説明書は、この製品の説明書によく
お読みください。また、必要に応じて
お読み直ししてください。

△【使用上の注意】

⊗ **してはいけないこと**
誤用しないでください。(使用す
る上、包装の破損による使用上の
危険、内容物の漏れによる汚損
防止のため)

Ⓛ 相対すること
1. 20歳未満の小児は、使用しない。
2. 20歳以上の妊婦は、使用しない。
3. 20歳以上の妊婦に使用している人(妊婦
の可能性があるため)は、使用しない。
4. 20歳以上の妊婦に使用している人(妊婦
の可能性があるため)は、使用しない。
5. 20歳以上の妊婦に使用している人(妊婦
の可能性があるため)は、使用しない。
6. 20歳以上の妊婦に使用している人(妊婦
の可能性があるため)は、使用しない。
7. 20歳以上の妊婦に使用している人(妊婦
の可能性があるため)は、使用しない。
8. 20歳以上の妊婦に使用している人(妊婦
の可能性があるため)は、使用しない。
9. 20歳以上の妊婦に使用している人(妊婦
の可能性があるため)は、使用しない。
10. 20歳以上の妊婦に使用している人(妊婦
の可能性があるため)は、使用しない。

その他の注意
直腸内に挿入し、直腸内に留め、排便後、
残液を洗い流す。

新薬株式会社
電話 0120-85-0107

【使用法】
① 浣腸の準備
② 浣腸の挿入
③ 浣腸の留め
④ 浣腸の排便
⑤ 浣腸の残液の洗い流し

【保存法】
① 直射日光を避けて保存してください。
② 高温多湿を避けて保存してください。
③ 開封後は、必ず蓋をしっかりと閉めてください。
④ 開封後は、必ず蓋をしっかりと閉めてください。
⑤ 開封後は、必ず蓋をしっかりと閉めてください。

