

ご使用前に、この説明文をよくお読みください。
また必要な時に読めるように保管してください。

作成日：2025 年 8 月 6 日

添付文書-40-r04

第 2 類医薬品

ミカサ浣腸N40

(情報は小箱に直接記載)

【使用上の注意】

してはいけないこと

連用しないでください。（常用すると、効果が減弱し（いわゆる“なれ”が生じ）薬剤にたよりがちになる。）



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- （1）医師の治療を受けている人
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人
（流早産の危険性があるので使用しないことが望ましい。）
- （3）高齢者
- （4）はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人
- （5）心臓病の診断を受けた人

2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがあります。

【効能・効果】 便秘

【用法・用量】

12歳以上1回1個（40g）を直腸内に注入します。
それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

<用法・用量に関する注意>

- （1）用法・用量を厳守してください。
- （2）本剤使用後は、便意が強まるまでしばらくがまんしてください。
（使用後、すぐに排便を試みると、薬剤のみが排出され、効果がみられないことがあります。）
- （3）12歳未満の小児には、使用させないでください。
- （4）浣腸にのみ使用してください。（内服しないでください。）

【使用方法】

- ① 容器先端のキャップを取りはずし、肛門部へなるべく深く挿入します。
(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。)
- ② 容器を押しつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。
- ③ 薬液注入後、十分便意が強まってから排便してください。
 - 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
 - 冬季は容器を温湯(40℃位)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

【便秘しがちな方のために】

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけましょう。
また、便意をもよおした時は、がまんせずトイレに行きましょう。
2. 繊維質の多い食べ物と水分を多くとるように心がけましょう。
(例：野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など)
3. 適度な運動、腹部マッサージ等を行うよう心がけましょう。
4. 早朝、起きがけに冷たい水または牛乳などを飲むと、便意をもよおしやすくなります。

【成分・分量】本品1個(40g)

日局 グリセリン・・・・・・・・ 20.0g

添加物として ベンザルコニウム塩化物含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【包装】40g×10個入り

電話：0120-85-0107

受付時間8：30～17：00(土日祝を除く)

製造販売元



ムネ製薬株式会社

兵庫県淡路市尾崎 859

<https://www.mune-seiyaku.co.jp>

日本製

副作用救済制度
電話：0120-149-931