


コリス浣腸 30 20 個入り

# KOTOBUKI ENEMA 30 (30g×20個)

SIZE:W524mm × H276mm



**【販売名】コリス浣腸30**  
**【成分・含量】**本品1個(30g)中  
 甘油グリセリン 15.0g  
 薬液としてベンザリウムクロリド水溶液を  
 添加して有酸素  
**【性状】**白色液状  
**【用法・用量】**12歳以上1個(30g)を浣腸筒に注入します。  
 それで効果のあられない場合には、さらに再度をもう一つ一  
 注入してください。  
**<用法・用量に関する注意>**  
 ①用法・用量を厳守すること。  
 ②本剤が浣腸は、効果が現れるまでしばらくがまんすること。  
 (効果の、すでに効果が認められ浣腸の効果が認められ、効果が  
 認められないことがある。)  
 ③効果の認められない場合には使用させないこと。  
 ④浣腸の必要使用する回数。  
 ⑤浣腸に注入すると、薬液粘着を伴うおそれがあるので  
 注意してください。  
 ⑥冬季は浣腸を室温(40℃)に入れ、体温近くまで暖めると  
 効果に役立ちます。  
 製造販売元 **丸美製薬株式会社**  
 丸美製薬株式会社 東京都目黒区 電話 03-3545-0107  
 受付時間 9:30~17:00(土日祝を除く)  
<http://www.nm-medypharma.co.jp>

**【使用上の注意】**  
 ① 使用前に、この種の薬液をお読みください。  
 また必要な時に薬めるように保管してください。

**【用法・用量】**  
 ① 用法・用量を厳守すること。  
 ② 本剤が浣腸は、効果が現れるまでしばらくがまんすること。  
 (効果の、すでに効果が認められ浣腸の効果が認められ、効果が  
 認められないことがある。)  
 ③ 効果の認められない場合には使用させないこと。  
 ④ 浣腸の必要使用する回数。  
 ⑤ 浣腸に注入すると、薬液粘着を伴うおそれがあるので  
 注意してください。  
 ⑥ 冬季は浣腸を室温(40℃)に入れ、体温近くまで暖めると  
 効果に役立ちます。

**【使用上の注意】**  
 ① 使用しないこと(使用すると、効果が減弱し「いぼ」や「なれ」が生じ、薬剤にたよ  
 りがなくなる。)  
 ② 使用しないこと(使用すると、効果が減弱し「いぼ」や「なれ」が生じ、薬剤にたよ  
 りがなくなる。)  
 ③ 使用しないこと(使用すると、効果が減弱し「いぼ」や「なれ」が生じ、薬剤にたよ  
 りがなくなる。)  
 ④ 使用しないこと(使用すると、効果が減弱し「いぼ」や「なれ」が生じ、薬剤にたよ  
 りがなくなる。)  
 ⑤ 使用しないこと(使用すると、効果が減弱し「いぼ」や「なれ」が生じ、薬剤にたよ  
 りがなくなる。)  
 ⑥ 使用しないこと(使用すると、効果が減弱し「いぼ」や「なれ」が生じ、薬剤にたよ  
 りがなくなる。)  
 ⑦ 使用しないこと(使用すると、効果が減弱し「いぼ」や「なれ」が生じ、薬剤にたよ  
 りがなくなる。)  
 ⑧ 使用しないこと(使用すると、効果が減弱し「いぼ」や「なれ」が生じ、薬剤にたよ  
 りがなくなる。)  
 ⑨ 使用しないこと(使用すると、効果が減弱し「いぼ」や「なれ」が生じ、薬剤にたよ  
 りがなくなる。)  
 ⑩ 使用しないこと(使用すると、効果が減弱し「いぼ」や「なれ」が生じ、薬剤にたよ  
 りがなくなる。)

【販売名】  
**30g×20個入 30g of twenty case** **おトクな 20 個入**  
**植物由来のグリセリン 12才以上 Over 12 years old.**  
**KOTOBUKI ENEMA30 30g浣腸**  
**便秘でお困りの方に、出したい時にすぐ出せる**  
 It's an enema made in Japan for people having a problem with constipation.  
 When you want to empty the bowel, you can do it immediately.

植物由来のグリセリン 12才以上 Over 12 years old.  
**KOTOBUKI ENEMA30 30g浣腸**  
**便秘でお困りの方に、出したい時にすぐ出せる**  
 It's an enema made in Japan for people having a problem with constipation.  
 When you want to empty the bowel, you can do it immediately.  
**30g×20個入 30g of twenty case**

植物由来のグリセリン **おトクな 20 個入**  
**KOTOBUKI ENEMA30 30g浣腸**  
**便秘でお困りの方に、出したい時にすぐ出せる**  
**30g of twenty case**  
 12才以上 Over 12 years old. 【販売名】

## 30g用浣腸

## 日本文

ご使用前に、この箱の説明文をお読みください。  
また必要な時に読めるように保管してください。

**成分・分量 (30g) 中**

日局 グリセリン・・・・・・・・15.0g

添加物として ベンザルコニウム塩化物含有  
溶剤として精製水

**[効能・効果]**

便秘

**[用法・用量]**

12歳以上1回1個(30g)を直腸内に注入します。それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

**<用法・用量に関する注意>**

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。)
- (3)12歳未満の小児には使用させないこと。
- (4)浣腸にのみ使用すること。
- (5)無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
- (6)冬季は容器を温湯(40℃)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

## English

Before using this product, thoroughly read the following description.

Store in a safe place so it can be read at a later time.

**Ingredient/content in 30 g**

JP glycerin・・・・・・・・15.0 g

Benzalkonium chloride is also included as an additive.

Purified water as solvent

**[Indication]**

Constipation

**[Dosage and administration]**

For patients over 12 years of age, one unit(30g) at a time is administered rectally.

If no effect is observed, give the same dose once more.

**<Precautions for dosage and administration>**

- (1) Strictly follow the dosage and administration.
- (2) Hold back until you feel a strong desire to defecate after injection of the enema. (if you evacuate the bowel shortly after use, only the solution is evacuated, resulting in no effect.)
- (3) Do not use this product for children under 12 years old.
- (4) Do not use this product for purposes other than as an enema.
- (5) Do not forcibly insert the tube to avoid injury to the rectal mucosa.
- (6) Place this product in warm water at body temperature (40℃) before use during the winter for increased comfort.

**[使用法]**

- ①容器先端のキャップを取りはずし、挿入部に傷などがないか確かめて、肛門部へなるべく深く挿入します。(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。)
- ②容器をおしつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。
- ③薬液注入後、2～5分がまんして十分便意が強まってから排便してください。

**[便秘しがちな方のために]**

- 1.規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけてください。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレに行ってください。
- 2.繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけて下さい。(例:野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻等)
- 3.適度な運動、腹部マッサージなどを行うよう心がけて下さい。
- 4.早朝、起きがけに冷たい水または牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなります。

**[使用上の注意]****してはいけないこと**

連用しないこと(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになる。)

**[Administration]**

- ①Make certain there is no wound on the inner wall of the anus, then remove the cap from the tip of the tube and insert the tube deeply into the anus. (if you cannot smoothly insert the tube, extrude and spread a small amount of the solution around the tip of the tube, so that insertion will be easier).
- ②Slowly inject the solution by squeezing the bottle.
- ③After injection of the solution, hold back for 2-5 minutes until you feel a strong desire to defecate.

**[For persons with a tendency for constipation]**

1. It is important to have a habit of regular defecation. Try to go to the toilet at a specific time of the day for a certain period.  
Do not hold back if you feel a desire to defecate.
2. Try to eat food with a high fiber and water content. (e.g., vegetables, fruits, yam paste, agar, and seaweed)
3. Try to perform moderate exercise and stomach massage.
4. Drinking cold water or milk shortly after rising in the morning helps you to feel a desire to defecate.

**[Precautions for use]****Things not to do**

Do not use this product continuously (continuous use may lead to a decreased effect and dependence on the product.)

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者。
- (4) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
- (5) 心臓病の診断を受けた人。

2. 2～3回使用しても排便がない場合は、使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**その他の注意**

次の症状があらわれることがある

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感があらわれることがある。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になりたり品質が変わる。)

製造販売元

ムネ製薬株式会社

兵庫県淡路市尾崎 859

電話:0799-85-0107

**Issues to discuss**

1. The following persons should consult with a physician, pharmacist, or registered pharmacy before using this product:

- (1) Persons who are already being treated by a physician.
- (2) Women who are pregnant or are possibly pregnant (use of this product is not recommended due to the risk of miscarriage and premature delivery.)
- (3) Elderly persons.
- (4) Persons who suffer from severe abdominal pain, nausea, vomiting, and hemorrhoidal bleeding.
- (5) Persons who have heart disease.

2. When no effect is obtained even after using this product 2-3 times, stop using it and obtain advice from a physician, pharmacist, or registered pharmacy, taking this document with you

**Other precautions**

Dizziness on standing up, or a sensation of heat in the anal region and anal discomfort may occur.

**【Precautions for storage and handling】**

- (1) Store this product in a cool place protected from direct sunlight.
- (2) Keep this product out of the reach of children.
- (3) Do not put the solution into other containers. (this may lead to incorrect use or loss of quality.)

Marketing authorisation holder

Mune Pharmaceutical Co., Ltd.

859 Osaki Awaji city Hyogo Prefecture Japan

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話:0120-149-931