

ご使用前に、この箱の説明文をお読みください。
また必要な時に読めるように保管してください。

平成 26 年 8 月作成

第 2 類医薬品

ビワ湖浣腸ジャバラ

(情報は小箱に直接記載)

[使用上の注意]

してはいけないこと

連用しないこと (常用すると、効果が減弱し (いわゆる“なれ”が生じ) 薬剤にたよりがちになる。)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者。
- (4) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
- (5) 心臓病の診断を受けた人。

2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



その他の注意

次の症状があらわれることがある

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

[効能・効果] 便秘

[用法・用量]

12歳以上1回1個(30g)を直腸内に注入します。
それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。)
- (3) 12歳未満の小児には使用させないこと。
- (4) 浣腸にのみ使用すること。
- (5) 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
- (6) 冬季は容器を温湯(40℃)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

【使用方法】

- ① 首部を持ち、キャップを静かに外してください。
(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。)
- ② 挿入部に傷等がないか確かめて、肛門部に挿入し、容器を静かに押しつぶしながら、ゆっくりと薬液を注入してください。
- ③ 挿入部分が長く(当社比)容器は押しつぶしやすいジャバラ式ですので、力の弱いお年寄りの方にも、より使いやすくなりました。
- ④薬液注入後、2～5分我慢して十分便意が強まってから排便してください。



【使用方法】

- ①首部を持ち、キャップを静かに外してください。
- ②挿入部に傷等がないか確かめて、肛門部へ挿入し、容器を静かに押しつぶしながら、ゆっくりと薬液を注入してください。
- ③挿入部分が長く(当社比)容器は押しつぶしやすいジャバラ型ですので、力の弱いお年寄りの方にも、より使いやすくなりました。
- ④薬液注入後、2～5分がまんして十分便意が強まってから排便してください。

[便秘しがちな方のために](小箱に記載なし)

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけてください。
また、便意をもよおした時は、がまんせずトイレに行ってください。
2. 繊維質の多い食べ物と水分を多くとるように心がけてください。
(例：野菜類・果物・コンニャク・カンテン・海藻等)
3. 適度な運動、腹部マッサージ等を行うよう心がけてください。
4. 早朝、起きがけに冷たい水または牛乳等を飲むと、便意をもよおしやすくなります。

【成分・分量】本品1個(30g)中

日局 グリセリン15.0g

添加物として ベンザルコニウム塩化物含有
溶剤として精製水

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【包装】30g×10個入

販売元 オールジャパンドラック株式会社

発売元 伊丹製薬株式会社 滋賀県高島市今津町下弘部 280 番地
お客様相談室 ☎0740-22-2059

受付時間：9時～16時30分(土、日、祝日を除く)

製造販売元  ムネ製薬株式会社

兵庫県淡路市尾崎 859

(独) 医薬品医療機器総合機構副
作用被害救済制度
☎0120-149-931

30 g 浣腸英文

<Composition>

Each 30g contains 15g of glycerin(JP)and benzalkonium chloride as an additive.

<Dosage and Administration>

For patients over 12 years of age, one unit(30g) at a time is administered rectally.

If this dosage does not relieve constipation, the same dosage can be administered again.

<Indications>

Constipation

Made in Japan

■ ビワ湖浣腸ジャバラ パッケージご提案6th

SIZE:W396mm × H254.5mm



【便秘しがちな方のために】

- 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけてください。また、便意をもよおした時は、がまんせずトイレに行ってください。
- 繊維質の多い食べ物と水分を多くとるように心がけてください。(例:野菜類・果物・コンニャク・カンテン・海藻等)
- 適度な運動、腹部マッサージ等を行うよう心がけてください。
- 早朝、起きがけに冷たい水または牛乳等を飲むと、便意をもよおしやすくなります。



【用法・用量】12歳以上1回1個(30g)を直腸内に注入します。それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

<用法・用量に関する注意>

- ① 用法・用量を厳守すること。
- ② 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。)
- ③ 12歳未満の小児には使用させないこと。
- ④ 浣腸にのみ使用すること。
- ⑤ 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
- ⑥ 冬季は容器を温湯(40℃)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

発売元
オールジャパンドラッグ株式会社
 発売元
伊丹製薬株式会社
 滋賀県高島市今津町下弘部280番地
 お客様相談室 ☎0740-22-2059
 受付時間:9時~16時30分(土、日、祝日を除く)
 製造販売元
ムネ製薬株式会社

△【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと
運用しないこと(常用すると、効果が減弱し「いわゆる“なれ”が生じ”薬剤にたよりがちになる。)

⚠ 相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(流産の危険性があるため使用しないことが望ましい。)
 - (3) 高齢者。
 - (4) はげしい腹痛、吐き気、嘔吐、痔出血のある人。
 - (5) 心臓病の診断を受けた人。
- ② 2~3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意
 次の症状があらわれることがある
 立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

使用期限/製造番号

【保管及び取扱い上の注意】
 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
 (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

ご使用前に、この箱の説明文をお読みください。また必要な時に読めるように保管してください。

【成分・分量】本品1個(30g)中
 日局 グリセリン.....15.0g
 添加物としてベンザルコニウム塩化物含有
 溶剤として精製水
【効能・効果】便秘

【使用方法】

- 1** 首部を持ち、キャップを静かにはずしてください。
- 2** 挿入部に傷等がないか確かめて、肛門部へ挿入し、容器を静かに押しつぶしながら、ゆっくりと薬液を注入してください。
- 3** 挿入部分が長く(当社比)容器は押しつぶしやすいジャバラ型ですので、力の弱いお年寄りの方にも、より使いやすくなりました。
- 4** 薬液注入後、2~5分がまんして十分便意が強まってから排便してください。

(滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。)

副作用救済制度の問い合わせ先 (独)医薬品医療機器総合機構 電話:0120-149-931