

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

2013年3月 記載要領変更に伴う改訂

第2類 医薬品 ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ぎょう虫駆除薬

パモキサン錠

パモ酸ピルビニウム製剤

- ●配合成分パモ酸ピルビニウムは腸管からはほとんど吸収されず、ぎょう虫に直接作用してすぐれた駆虫効果を発揮します。
- ●1回の服用で効果を発揮します。
- のみやすいピンク色のフィルムコート錠です。

/ 使用上の注意

図 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の駆虫薬、ヒマシ油

■ 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃痛、腹痛、吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛、めまい
その他	倦怠感

3.服用しても効果がみられない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

蟯(ぎょう)虫の駆除

〔用法·用量〕

年 齢	1回服用量	1日服用回数	
大人(15才以上)	5錠		
11~14才	3錠	10	
8~10才	2錠		
5~ 7才	1錠		
5才未満	服用しないでください		

2回以上続けて服用しないでください。



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 便秘性の人は本剤服用後、虫を排泄するため、適宜瀉下薬を用いてください。
- (4)歯に色がつかないように、かまずにそのまま服用してください。
- (5)食事に関係なく、いつでも服用できます。
- (6)1回の服用で効果を発揮します。なお、再度駆虫を必要とする場合は、 1ヶ月以上の間隔をおいてください。

(7)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTP シートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に 突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



[成分・分量と働き]5錠中-

成 分	分 量	働き
パモ酸ピルビニウム	376.25mg (ピルビニウム塩基と して250mg)	腸管からはほとんど吸収されず、ぎょう虫に直接作用して、 駆除します。

添加物として、CMC-Ca、トウモロコシデンプン、ステアリン酸ポリオキシル、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、赤色102号、黄色5号を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤服用後に尿又は便が赤く着色することがあります。

●保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

●その他の注意)

ぎょう虫は、ヒトの盲腸などに寄生します。夜間就寝時に 産卵のため肛門に出てきて動きまわります。このため肛 門のまわりがかゆくなり、お子様の夜泣きの原因になる ことがあります。

また、ぎょう虫は無意識にかいた手指や下着について、ヒトの口から容易に感染しますので、手をよく洗うなど家族感染に注意してください。



副作用被害教済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル) 本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口 電話 03(5412)7393

電話 03 (5412) 7393 受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く) 製造販売元

佐藤製薬株式会社 東京都港区元赤坂1丁目5番27号



