

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

第2類医薬品

精選生葉循環器用葉
(五疳強心葉)

救心錠剤[®]

どうきや息切れは、循環器系や呼吸器系の働きの低下をはじめ、過度の緊張やストレス、更年期や暑さ・寒さなどによる自律神経の乱れ、過労や睡眠不足、タバコやアルコールのみ過ぎ、肥満、激しい運動など、さまざまな原因で現れてきます。

また、加齢などによって身体の諸機能が低下してくると、どうきや息切れも起こりやすくなります。

さらに、こうした症状を放置しておくと、さまざまな疾病発症の要因となり、しだいに生活の質の低下を引き起こすようになります。

救心錠剤は9種の動植物生葉がそれぞれの特長を發揮し、血液循環を改善してこのようなどうきや息切れにすぐれた効きめを現します。

身体がだるくて気力が出ないときや、暑さなどで頭がボーッとして意識が低下したり、めまいや立ちくらみがしたときの気づけにも救心錠剤は効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる〕
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の強心葉



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

3. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効 能

どうき、息切れ、気つけ

●こんなときのどうき・息切れに



●こんなときの気つけに

用法・用量

朝夕および就寝前に水またはお湯で服用すること

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1錠	1日3回
15才未満	服用しないこと	

口の中や舌下にとどめたり、かんだりしないこと
(このようないみ方をすると、成分の性質上、舌や口の中にしびれ感がしばらく残ります。)

成 分

『救心錠剤』はフィルムコーティング錠で、3錠中に次の成分を含みます。

成 分	分 量	主な作用
せん 蟻 酥	5mg	心筋の収縮力を高めて血液循環をよくし、余分な水分を排泄して心臓の働きを助けます。また、呼吸機能を高めて全身の酸素不足を改善します。
牛 黄	4mg	末梢循環を改善し、心臓の働きを助けます。
鹿 薺 末	5mg	強壮作用により気力を高めます。
人 参	25mg	
羚羊角末	6mg	
真 珠	7.5mg	鎮静作用によりストレスなどからくる神経の緊張を和らげます。
沈 香	3mg	
龍 脳	2.7mg	気力や意識の減退を回復させます。
動 物 胆	8mg	消化器の働きをよくし、他の成分の吸収を助けます。

添加物として乳糖、クロスカルメロースNa、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、酸化チタン、スクラロース、三二酸化鉄、カルナウバロウを含有します。

☆救心錠剤はすぐれた効果を発揮できるように配合が考えられております。
☆救心錠剤は1回1錠の服用しやすいフィルムコーティング錠で、崩壊性にすぐれております。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になつたり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

◎心臓への負担を和らげるために

過度な飲食や肥満、喫煙習慣、急激な温度変化や夜ふかしは、心臓に負担をかけ、どうきや息切れの原因となります。

●過度な飲食や肥満



●喫煙習慣



●急激な温度変化や夜ふかし



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

救心お客様相談室 ☎ 0120-935-810

[受付時間] 9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)



救心製薬株式会社

東京都杉並区和田1-21-7

電話03-5385-3211(代表)

®登録商標