



第2類医薬品

奈3-54-111

仁救六神丸

● 健康と心臓に一日三粒 ●

効能効果

動悸、息切れ、気付け

用法用量

大人十五才以上二回一丸一日三回、食後白湯又は清水にて服用する。

注意

一、服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

二、服用に際しては、添付文書をよく読むこと。

三、直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。

四、配置期限の過ぎた製品は、服用しないこと。

副作用被害救済制度電話〇三〇一四九九三

成分・分量 一日量(三丸中)

ゴオウ 一、二粒

牛黄 一、二粒

センソ 五、〇粒

蟾酥 五、〇粒

口クジヨウ 五、〇粒

鹿茸 五、〇粒

サフラン 一五、〇粒

蕃紅花 一五、〇粒

イカリソウエキス 一〇、〇粒
(原生薬換算量 一〇〇粒)
添加物 バレシヨアミン、マクロゴール、タルク、グリセリン、デヒドロ酢酸Na、その他成分は添付文書に記載

一三五粒入 金四、八〇〇円 + 税



外装フィルム

配置期限

文書改訂年月
平成二十五年四月

生薬強心臓器薬

臓器薬 仁救六神丸

第2類
医薬品

服用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
又、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

◎ 健康と心臓の為に一日三粒 ◎

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
- 一、小児には服用させないこと
- 二、本剤を服用している間は、他の強心薬を服用しないこと

⊗ 相談すること

- 一、次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (一) 医師の治療を受けている人。
 - (二) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (三) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 二、服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

- 三、五〜六日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分及び分量】

一日量(三丸)中

鱈酥(センソ)	五.〇 粒
牛黄(ゴオウ)	一.二 粒
鹿茸(ロクジョウ)	五.〇 粒
蕃紅花(サフラン)	十五.〇 粒
淫羊藿(インヨウカク)	一〇.〇 粒
イカリソウエキス(原生薬換算量一〇〇粒)	一〇.〇 粒
添加物として チョウジ末、D-ボルネオール、パレシヨテンブン、グルコン酸Ca、寒梅粉、グリセリン、デヒドロ酢酸Na、タルク、アラビアゴム、薬用炭、マクログールを含有する。	

【用法及び用量】

一日三回 食後白湯又は清水にて服用する。

年齢	一回量	一日服用回数
大人 十五才以上	一丸	三回
十五才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (一) 用法及び用量を厳守すること。
- (二) かまずに服用すること。

【効能又は効果】

動悸、息切れ、気付け

【保管及び取り扱い上の注意】

- (一) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
 - (二) 小児の手の届かない所に保管すること。
 - (三) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
 - (四) 期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- 副作用被害救済制度 電話 〇一二〇・一四九・九三二

【お問合せ先】

お客様相談窓口 電話 〇七四五・五五・〇〇四四
受付時間 十時〜十七時(土・日・祝日を除く)

TRADE MARK



ホシタカ印

仁救本舗

成光薬品工業株式会社

電話 〇七四五・〇〇四四

奈良県北葛城郡広陵町大塚七三九