

文書改訂年月
平成二十五年二月

服用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
又、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類
医薬品

JINKYU

生薬強心臓器薬

強心剤

成光

仁救

ジン キユウ

●健康と心臓の為に朝夕一粒

SEIKO YAKUHIN KOGYO

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (一) 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる
- 小児には服用させないこと
- 本剤を服用している間は、他の強心薬を服用しないこと

🗨️ 相談すること

- 一 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (一) 医師の治療を受けている人。
 - (二) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (三) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 二 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

- 三 五〜六日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分及び分量】

ゴオウ (牛黄)	一日量 (二粒) 中	二、〇 甎
ロクジョウ (鹿茸)		一〇、〇 甎
ジンコウ (沈香)		二、四 甎
サフラン (番紅花)		七、五 甎
センソ (蟾酥)		五、〇 甎
ウルソデオキシコール酸		五、〇 甎
d-ボルネオール		二、四 甎
添加物として デヒドロ酢酸Na	グリセリン	タルク
寒梅粉	薬用炭を含有する。	アラビアゴム末

【用法及び用量】

一日二回 朝夕食後白湯にて服用する。

年齢	一回量	一日服用回数
大人 十五才以上	一粒	二回
十五才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (一) 用法及び用量を厳守すること。
- (二) かまずに服用すること。

【効能又は効果】

動悸、息切れ、気付け

【保管及び取り扱上の注意】

- (一) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (二) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (三) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (四) 配置期限の過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度

【お問い合わせ先】

相談窓口 電話 〇一〇〇・一四九・九三一
電話 〇七四五・五五・〇〇四四
受付時間 十時〜十七時(土・日・祝日を除く)

TRADE MARK



ホシタカ印

仁救

本舗 成光薬品工業株式会社

奈良県北葛城郡広陵町大塚七三九

電話(〇七四五) 〇〇四四番





強 心 劑 救 仁 光 成

品名

用法用量

大人十五才以上一回一粒
一日 二回、朝夕 食後
白湯にて服用する。

効能効果

動悸、息切れ、気付け

注意

- 一、服用が適さない場合があるの
で、服用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談すること
- 二、服用に際しては、添付文書を
よく読むこと
- 三、直射日光の当たらない湿気の
少ない涼しい所に密栓して保
管すること
- 四、配置期限の過ぎた製品は、服用
しないこと

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

成分分量 (一日量(二粒)中)

ゴオウ牛黄……………二、〇粒
ロクジヨウ鹿茸……………二、〇粒
ジンコウ沈香……………二、四粒
サフラン蕃紅花……………七、五粒
センソ蟾酥……………五、〇粒
ウルンデオキシコール酸……………五、〇粒
d-ボルネオール……………二、四粒
添加物 デヒドロ酢酸Na、グリセリン、タルク、アラビアゴム末、寒梅粉、薬用炭

第2類
医薬品

外装フィルム

一 二〇粒入

定価九、一〇〇円十^⑥

成光薬品工業株式会社



奈良県北葛城郡広陵町大塚739

配置期限