

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

第2類医薬品

皇漢臓器藥 脣仁源



【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の強心薬

相談すること

一、次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- ①医師の治療を受けている人。
- ②妊娠又は妊娠していると思われる人。

二、次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- ①服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる） 等があらわれる。 まれに左記の重篤な症状が起ることがあります。 その場合は直ちに医師の診療を受けること。

②五～六日間服用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

心臓病、肋膜炎、急病気附、めまい、盜汗

【用法・用量】

大人(十六才以上)一日二回、一回〇・三g (添付匙一回一杯)

十五才から八才まで……………大人の $\frac{1}{2}$ 量

七才から五才まで……………大人の $\frac{1}{3}$ 量

四才から一才まで……………大人の $\frac{1}{4}$ 量

一才以下……………大人の $\frac{1}{6}$ 量

（用法・用量に関する注意）
一、小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
二、一才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

【成分・分量】

一日量〇・六g 中次のものを含有する。

ゴ オ ウ	四〇 mg	d-カンフル	一
ジ ャ コ ウ	一〇 mg	龍 腸	一
ユ ウ タ ナ	五 mg	何 首 烏 末	一〇〇 mg
セ ン ソ	一 mg	ニンジン末	三三四 mg

【保管および取扱い上の注意】

一、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、密栓して保管すること。

二、小児の手の届かない所に保管すること。

三、誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れ替えないこと。

【問い合わせ先】

チベン製薬株式会社

〒五六七〇〇七三 大阪府茨木市西穂積町三番八号
電話〇七二六二二五〇九 FAX〇七二六二五六三〇

製造販売元

日東製薬有限会社
〒五六一〇八八四 大阪府豊中市岡町北一丁目五番二八号

発 売 元

チベン製薬株式会社
〒五六七〇〇七三 大阪府茨木市西穂積町三番八号