

よい漢方を

生薬製剤

キョウシン

内容量  
120g

## ⚠ 使用上の注意

## ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の強心薬。



## ■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 胃腸の弱い人。(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位   | 症 状                  |
|--------|----------------------|
| 皮膚(ひふ) | 発疹・発赤、かゆみ            |
| 消化器    | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称    | 症 状                               |
|----------|-----------------------------------|
| 腸間膜静脈硬化症 | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。 |

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## ■ 効能・効果

心臓病

## ■ 用法・用量

1日3回、食間に湯または水にて服用してください。

|          |         |      |
|----------|---------|------|
| 大 人      | 1 回 量   | 20 丸 |
| 15才未満7才迄 | 1 回 量   | 10 丸 |
| 7才未満の小児  | 服用しないこと |      |

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) かまずに服用してください。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ■ 成分・分量 (1丸、100mg) 中

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 日本薬局方 コウブシ …… 18.0mg | 日本薬局方 ニンジン …… 4.95mg |
| 日本薬局方 サンシシ …… 18.0mg | 日本薬局方 ビャクジュツ 18.0mg  |
| 日本薬局方 センキュウ… 18.0mg  | シンギク …………… 18.0mg    |
| 日本薬局方 センソ …… 0.05mg  | 添加物としてコメデンプン含有する     |

### <保管及び取扱い上の注意>

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)(4) 本剤は天産物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。(5) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを食べたりしないようご注意ください。

【発売元・お問合せ先】

**日の丸漢方**

京都市下京区室町通六条下ル

TEL 075-351-6810

【製造販売元】

**株式会社栃本天海堂**

大阪市北区末広町3番21号

製造番号

副作用被害救済制度

 0120-149-931