

よい漢方を

生薬製剤

キョウシン

内容量
120g

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の強心薬。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 胃腸の弱い人。(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚（ひ ふ）	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

心臓病

■ 用法・用量

1日3回、食間に湯または水にて服用してください。

大 人	1 回 量	20 丸
15才未満7才迄	1 回 量	10 丸
7才未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) かまずに服用してください。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量 (1丸、100mg) 中

日本薬局方 コウブシ …… 18.0mg	日本薬局方 ニンジン …… 4.95mg
日本薬局方 サンシシ …… 18.0mg	日本薬局方 ビャクジュツ 18.0mg
日本薬局方 センキュウ… 18.0mg	シンギク …………… 18.0mg
日本薬局方 センソ …… 0.05mg	添加物としてコメデンプンを含有する

<保管及び取扱い上の注意>

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)(4) 本剤は天産物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。(5) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを食べたりしないようご注意ください。

【発売元・お問合せ先】

日の丸漢方

京都市下京区室町通六条下ル

TEL 075-351-6810

【製造販売元】

株式会社栃本天海堂

大阪市北区末広町3番21号

製造番号

副作用被害救済制度

 0120-149-931