

2012年8月(記載要領変更に伴う改訂)

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面およびビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

血中の脂質に **ドルチール**[®] 血清高コレステロール改善薬

販売名:ドルチール

第3類医薬品

製品特徴

ドルチールは、血中の脂質※が気になる方や、血中の脂質※が多く、血流がスムーズでない方に適しています

- 血中の脂質※を減らして、スムーズな流れにします
- 2つの働きのある有効成分「リボフラビン酪酸エステル」が、血中の脂質※を減らします
 - ① 血中の脂質※が余分に作られることを抑える
 - ② 余分な血中の脂質※を体外へ排出する
- 1日2回の服用で効いていきます
- 飲みやすい小粒の錠剤です

※血中の脂質とは、コレステロールのことです

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、胃部不快感、胸やけ、胃部膨満感、食欲不振 |
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること:下痢
 4. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果 血清高コレステロールの改善

用法・用量 次の量を食後に水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	2錠	2回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
- (2)吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとめること

成分・分量 1日量(4錠)中

成 分	分 量
リボフラビン酪酸エステル	60mg

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mgを含有する

- リボフラビン酪酸エステルにより尿が黄色くなる場合がありますが、心配ありません

- 錠剤に見られる小さな赤い斑点は、有効成分をそのまま成形したことによるものです

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること(2)小児の手の届かないところに保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないこと(5)ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること(6)乾燥剤は服用しないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
製品のお問合せ先(お客様相談室)
☎ 0120-5884-01
受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3
MADE IN JAPAN