

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

血清高コレステロール改善薬

第3類医薬品

# コレスゲン

『コレスゲン』は、血清高コレステロールを改善し、また、血清高コレステロールにより生じる手足の冷え・しびれを緩和する医薬品です。

パンテチンは、肝臓におけるコレステロール代謝の促進により、血液中の過剰なコレステロールを減少させ、血管壁への沈着を抑えます。酢酸d- $\alpha$ -トコフェロールは過酸化脂質の生成を抑え、大豆油不けん化物は小腸からのコレステロールの吸収を抑えます。

『コレスゲン』はこれら3種の成分の働きにより効果を発揮します。



## 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人  
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢、軟便
- 1ヵ月位服用してもコレステロール値の改善が見られない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1ヵ月ほど服用後、医療機関でコレステロール値の測定をしてください)
- 服用後、生理が予定より早きたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

血清高コレステロールの改善

血清高コレステロールに伴う末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)の緩和

裏面に続きます

## 用法・用量

次の量を食後に水又はぬるま湯で服用してください

年 齢	1 回服用量	1 日服用回数
成人 (15才以上)	2 カプセル	3 回
15才未満	服用しないこと	

## <用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください
- (2) 血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行ってください
- (3) カプセルの取り出し方  
図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります)



## 成分・分量

成人 1 日量 (6 カプセル) 中に次の成分を含んでいます

成 分	分 量	はたらき
パンテチン (80%パンテチン水溶液)	375mg	肝臓におけるコレステロール代謝の促進により、血液中の過剰なコレステロールを減少させ、血管壁への沈着を抑えます
大豆油不けん化物	600mg	大豆由来の成分で、小腸からのコレステロールの吸収を妨げ、排泄を促進します
酢酸 d- $\alpha$ -トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	抗酸化作用により、過酸化脂質の生成を抑制し、末梢血行障害を改善します


添加物としてポリソルベート80、サフラワー油、カプセルにゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール、サンセットイエローFCF、酸化チタンを含んでいます


## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください

## 本製品についてのお問い合わせ先

- ・ お買い求めのお店
- ・ 日邦薬品工業株式会社 学術情報室  
住 所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16  
電 話：(03) 3370-7174(代表)  
受付時間：午前9:00から午後5:00まで(土、日、祝日を除く)

販 売 元  **日邦薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区代々木3-46-16

発 売 元  **日東薬品工業株式会社**  
京都府向日市上植野町南開35-3

製造販売元 **東海カプセル株式会社**  
静岡県富士市久沢168番地